

## Тенотен



### Код АТХ:

- [N05BX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Антитела к мозгоспецифическому белку S-100](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания. По 20 табл. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 1 или 2 контурных ячейковых упаковок помещают в картонную пачку.

### Состав:

Таблетки для рассасывания	1 табл.
<i>активное вещество:</i>	
антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные*	0,003 г
* Наносится на лактозу в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более $10^{-15}$ нг/г активной формы действующего вещества	
<i>вспомогательные вещества:</i> МКЦ — 0,03 г; магния стеарат — 0,003 г; лактозы моногидрат (лактоза) 0,267 г	

## Описание:

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской от белого до почти белого цвета. На стороне с риской нанесена надпись «MATERIA MEDICA», на другой — «TENOTEN».

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Нейротропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антиамнестическое, антистрессовое, нейропротективное, антигипоксическое, антиастеническое, ноотропное, антидепрессивное, анксиолитическое.

### **Фармакодинамика**

Оказывает успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие, не вызывая нежелательных гипногенного и миорелаксантного эффектов. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок. Обладает стресспротекторным, ноотропным, антиамнестическим, противогипоксическим, нейропротекторным, антиастеническим, антидепрессивным действием.

В условиях интоксикации, гипоксии, после острого нарушения мозгового кровообращения оказывает нейропротективное действие, ограничивает зону повреждения, нормализует процессы обучения и памяти в ЦНС.

Ингибирует процессы перекисного окисления липидов.

Модифицирует функциональную активность белка S-100, осуществляющего в мозге сопряжение синаптических (информационных) и метаболических процессов. Оказывая ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, повышает активность стресс-лимитирующих систем, способствует восстановлению процессов нейрональной пластичности.

## Показания к применению:

- невротические и неврозоподобные состояния;
- психосоматические заболевания;
- стрессорные расстройства с повышенной нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями;
- умеренно выраженные органические поражения ЦНС, в т.ч. травматического и дисциркуляторного происхождения, сопровождающиеся неустойчивостью эмоционального фона, раздражительностью, снижением памяти, вегетативными нарушениями.

## Относится к болезням:

- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Травмы](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 18 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь. Таблетки следует держать во рту до полного растворения.

Принимают по 1 или 2 таб. 2 раза в день, вне приема пищи. При необходимости частота приема может быть увеличена до 4 раз/сут. Курс лечения составляет 1-3 месяца; при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1-2 месяца.

При отсутствии стойкого улучшения состояния в течение 3-4 недель после начала лечения, пациенту необходимо обратиться к врачу.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

### **Передозировка:**

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Безопасность применения препарата Тенотен при беременности и в период лактации не изучалась. При необходимости приема препарата следует учитывать соотношение риск/польза.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

До настоящего времени не зарегистрировано случаев несовместимости с другими лекарственными средствами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В связи с наличием у препарата Тенотен активирующих свойств, последний прием препарата следует осуществлять не позже чем за 2 ч до сна.

#### *Использование в педиатрии*

Детям и лицам моложе 18 лет показано применение препарата Тенотен детский.

#### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не выявлено отрицательное влияние препарата Тенотен на способность к управлению транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

## **Тенотен**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Tenoten>