ТераФлю Бро



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения*** однородная, белого цвета, с характерным запахом камфоры и эфирных масел.

	1 г
масло розмарина	5%
масло листьев эвкалипта прутовидного	5%
перуанский бальзам	6%
камфора рацемическая	12.5%

Вспомогательные вещества: карбомер 974Р - около 1%, натрия гидроксида раствор 30% - около 0.71%, полисорбат 20 - 5%, вода очищенная - около 64.79%.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Обладает противовоспалительным, антисептическим, а также отхаркивающим действием.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата ТераФлю Бро не предоставлены.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии воспалительных и инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем:

— острый бронхит;

— хронический бронхит;

— трахеобронхит;

— трахеит;

— ОРЗ.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Инфекции
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— эпилептический синдром (в анамнезе);

— детский возраст до 3 лет;

— повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения мази;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 3 лет небольшое количество мази наносят 2-3 раза/сут на верхнюю и среднюю часть груди и спины. Слегка втирают до полного впитывания и прикрывают сухой теплой тканью.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Пациенты должны быть информированы, что при развитии каких-либо побочных реакций следует сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка:

Симптомы передозировки (при случайном приеме препарата внутрь), обусловленные наличием в составе препарата камфоры и эвкалиптового масла: тошнота, рвота, спастические боли в животе, головная боль, выраженное головокружение, покраснение лица, затруднение дыхания, делирий, судороги, угнетение ЦНС, кома.

Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, солевого слабительного. Неотложная помощь проводится в условиях стационара: при судорогах - в/в введением диазепама или применение барбитуратов короткого действия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

ТераФлю Бро не рекомендуется назначать при беременности (камфора проникает через плацентарный барьер) и в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении препарата ТераФлю Бро не было отмечено клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Нельзя наносить мазь на слизистые оболочки (особенно носа и рта), на ожоговые поверхности или на поврежденную кожу.

При попадании в глаза или на слизистую оболочку промыть холодной водой.

Препарат предназначен только для наружного применения. Препарат нельзя принимать внутрь.

Не оставляет жирных следов и пятен на одежде.

Не раздражает здоровую кожу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Мазь ТераФлю Бро не влияет на способностью к управлению транспортными средствами или механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 3 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/TeraFlyu_Bro