

## ТераФлю Бро



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** однородная, белого цвета, с характерным запахом камфоры и эфирных масел.

	<b>1 г</b>
масло розмарина	5%
масло листьев эвкалипта прутовидного	5%
перуанский бальзам	6%
камфора рацемическая	12.5%

*Вспомогательные вещества:* карбомер 974Р - около 1%, натрия гидроксида раствор 30% - около 0.71%, полисорбат 20 - 5%, вода очищенная - около 64.79%.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Обладает противовоспалительным, антисептическим, а также отхаркивающим действием.

#### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата ТераФлю Бро не предоставлены.

### Показания к применению:

В составе комплексной терапии воспалительных и инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем:

- острый бронхит;
- хронический бронхит;
- трахеобронхит;
- трахеит;
- ОРЗ.

**Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Инфекции](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

**Противопоказания:**

- эпилептический синдром (в анамнезе);
- детский возраст до 3 лет;
- повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения мази;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

**Взрослым и детям старше 3 лет** небольшое количество мази наносят 2-3 раза/сут на верхнюю и среднюю часть груди и спины. Слегка втирают до полного впитывания и прикрывают сухой теплой тканью.

**Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции.

Пациенты должны быть информированы, что при развитии каких-либо побочных реакций следует сообщить об этом лечащему врачу.

**Передозировка:**

*Симптомы* передозировки (при случайном приеме препарата внутрь), обусловленные наличием в составе препарата камфоры и эвкалиптового масла: тошнота, рвота, спастические боли в животе, головная боль, выраженное головокружение, покраснение лица, затруднение дыхания, делирий, судороги, угнетение ЦНС, кома.

*Лечение:* промывание желудка, назначение активированного угля, солевого слабительного. Неотложная помощь проводится в условиях стационара: при судорогах - в/в введением диазепама или применение барбитуратов короткого действия.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

ТераФлю Бро не рекомендуется назначать при беременности (камфора проникает через плацентарный барьер) и в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных).

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При применении препарата ТераФлю Бро не было отмечено клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Нельзя наносить мазь на слизистые оболочки (особенно носа и рта), на ожоговые поверхности или на поврежденную кожу.

При попадании в глаза или на слизистую оболочку промыть холодной водой.

Препарат предназначен только для наружного применения. Препарат нельзя принимать внутрь.

Не оставляет жирных следов и пятен на одежде.

Не раздражает здоровую кожу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Мазь ТераФлю Бро не влияет на способность к управлению транспортными средствами или механизмами.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано: детский возраст до 3 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/TeraFlyu\\_Bro](http://drugs.thead.ru/TeraFlyu_Bro)