# ТераФлю Экстра




## Код АТХ:

- N02BE51

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Парацетамол
- Фенилэфрин
- Фенирамин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный)*** сыпучий, содержащий гранулы белого и желтого цвета, со специфическим запахом, допускается наличие мягких комков.

| | **1 пак.** |
|---|---|
| парацетамол | 650 мг |
| фенирамина малеат | 20 мг |
| фенилэфрина гидрохлорид | 10 мг |

*Вспомогательные вещества:* сахароза - 12600 мг, ацесульфам калия - 19 мг, краситель хинолиновый желтый - 0.147 мг, краситель солнечный закат желтый - 0.035 мг, мальтодекстрин M100 - 26 мг, кремния диоксид - 13 мг, ароматизатор лимонный натуральный WONF Durarome 860.098 TD - 300 мг, ароматизатор лимонный натуральный Durarome 860.202 TD 09.91 - 35 мг, лимонная кислота - 1000 мг, натрия цитрата дигидрат - 180 мг, кальция фосфат - 35 мг.

15 г - пакетики 6-тислойные (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 или 25) - пачки картонные.
15 г - пакетики 4-хслойные (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 или 25) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Оказывает жаропонижающее, анальгезирующее, сосудосуживающее действие, устраняет симптомы "простуды". Сужает сосуды и устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки.

***Фармакокинетика***

Данные по фармакокинетике препарата ТераФлю Экстра не предоставлены.

## Показания к применению:

— симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ, в т.ч. гриппа), сопровождающихся высокой температурой, ознобом, головной болью, насморком, заложенностью носа, чиханьем, болями в мышцах.

## Относится к болезням:

- Головная боль
- Грипп
- Инфекции
- Насморк

## Противопоказания:

— сахарный диабет;

— портальная гипертензия;

— алкоголизм;

— одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО, бета-адреноблокаторов;

— дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальадсорбция;

— детский возраст до 12 лет;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при выраженном атеросклерозе коронарных артерий, при артериальной гипертензии, закрытоугольной глаукоме, тяжелых заболеваниях печени или почек, гиперплазии предстательной железы, заболеваниях крови, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, врожденной гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), гипертиреозе, феохромоцитоме, бронхиальной астме.

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь.

Содержимое пакетика растворяют в 1 стакане кипяченой горячей воды. Употребляют в горячем виде. Можно добавить сахар по вкусу.

Повторную дозу можно принимать через каждые 4 ч (не более 3 доз в течение 24 ч).

ТераФлю Экстра можно принимать в любое время суток, но наилучший эффект достигается при приеме препарата перед сном, на ночь.

Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, то пациент должен обратиться к врачу.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции*: возможно - кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек.

*Со стороны нервной системы:* возможно - повышенная возбудимость, нарушение сна, снижение скорости психомоторных реакций, сонливость, головокружение.

*Со стороны пищеварительной системы:* возможно - тошнота, рвота, боли в желудке, сухость во рту.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* возможно - сердцебиение, повышение АД.

*Со стороны органа зрения:* возможно - парез аккомодации, повышение внутриглазного давления.

*Со стороны мочевыделительной системы:* возможно - задержка мочи.

## Передозировка:

*Симптомы* (обусловлены действием парацетамола, проявляются после приема более 10-15 г): бледность кожных покровов, снижение аппетита, тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, в тяжелых случаях - печеночная недостаточность, гепатонекроз, повышение активности печеночных трансаминаз, увеличение протромбинового времени, энцефалопатия и коматозное состояние.

*Лечение:* промывание желудка в первые 6 ч, введение донаторов SH-групп и предшественников синтеза глутатиона - метионина через 8-9 ч после передозировки и ацетилцистеина через 12 ч.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять препарат при беременности и грудном вскармливании в связи с отсутствием данных по безопасному применению препарата у данной категории пациентов.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарат усиливает эффекты ингибиторов МАО, седативных средств, этанола.

Риск гепатотоксического действия парацетамола повышается при одновременном приеме барбитуратов, фенитоина, карбамазепина, рифампицина, зидовудина и других индукторов микросомальных ферментов печени.

При одновременном применении антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические средства, производные фенотиазина повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров.

При одновременном применении с ГКС повышается риск повышения внутриглазного давления.

Парацетамол снижает эффективность урикозурических препаратов и повышает эффективность непрямых антикоагулянтов.

При одновременном применении трициклические антидепрессанты усиливают симпатомиметическое действие.

При одновременное назначение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии.

Фенилэфрин снижает гипотензивное действие гуанетидина, который в свою очередь усиливает альфа-адреномиметический эффект фенилэфрина.

Этанол может усиливать седативное действие препарата.

## Особые указания и меры предосторожности:

Во избежание токсического поражения печени прием препарата не следует сочетать с употреблением алкоголя.

Не следует использовать препарат из поврежденных пакетиков.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Во время лечения не рекомендуется управлять автотранспортом и заниматься другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.

***При нарушениях функции почек***

С *осторожностью* следует применять препарат при тяжелых заболеваниях почек.

***При нарушениях функции печени***

С *осторожностью* следует применять препарат при тяжелых заболеваниях печени.

Во избежание токсического поражения печени прием препарата не следует сочетать с употреблением алкоголя.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/TeraFlyu_Ekstra