ТераФлю ЛАР



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензоксония хлорид
- Лидокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для местного применения*** прозрачный, бесцветный, с запахом мяты.

	10 мл
бензоксония хлорид	5 мг
лидокаина гидрохлорид	5 мг

Вспомогательные вещества: этанол, масло мяты перечной, ментол, лимонной кислоты моногидрат, глицерол, натрия гидроксид, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
200 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бензоксония хлорид - соль четвертичного аммония (N-бензил N-додецил N, N-ди(2-гидроксиэтил)аммония хлорид), благодаря своей катионной структуре обладает мембранотропной активностью и оказывает выраженное антибактериальное действие против грамположительных и, в меньшей степени, грамотрицательных микроорганизмов. Бензоксоний обладает также противогрибковой и противовирусной активностью по отношению к мембранным вирусам (в т.ч. вирусов гриппа, парагриппа и герпеса).

Лидокаин является местным анестетиком, который при воспалительных процессах уменьшает болезненные ощущения в горле при глотании.

Фармакокинетика

Бензоксония хлорид практически не абсорбируется. У человека приблизительно 1% вводимой дозы обнаруживается в моче, концентрация вещества в крови не обнаруживается. Не обнаружено накопление вещества в тканях организма.

Лидокаин абсорбируется при пероральном приеме и через слизистую оболочку ротовой полости.

Метаболизируется при "первом" прохождении через печень, при оральном введении его биодоступность составляет приблизительно 35%. Метаболиты выводятся вместе с мочой, менее 10% вещества выводятся в неизменном виде.

Показания к применению:

Инфекции полости рта и глотки:

— фарингит;

— ларингит;

— катаральная ангина;

— стоматит;

— язвенный гингивит.

В качестве вспомогательного средства:

— хронический тонзиллит.

Относится к болезням:

- Ангина
- Гингивит
- Ларингит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит
- Язвенный гингивит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к лидокаину или аммиачным соединениям;

— детский возраст до 4 лет;

— первый триместр беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Прополаскивать рот или гортань (по 30-60 секунд) утром и вечером после еды, используя 15-20 мл неразбавленного раствора. Раствор не глотать!

В том случае, если Вам назначено продолжительное лечение, можно применять раствор более часто или чередовать с применением таблеток, капсул или спрея.

Дети: препарат Терафлю Лар можно применять детям, начиная с 4 лет, однако при этом следует применять несколько меньшие дозы: при полоскании горла используется не более 10-15 мл раствора.

Побочное действие:

Иногда при применении Терафлю Лар наблюдается местное раздражение, которое носит временный характер. Аллергические реакции наблюдаются редко.

Во время применения препарата сроком более 2 недель может наблюдаться обратимая коричневая окраска языка или зубов.

Передозировка:

Случайный прием больших доз Терафлю Лар, как и других аммиачных соединений, может привести к появлению тошноты или рвоты. При отравлении следует выпить молока или съесть яичный белок, взбитый в воле

Содержание лидокаина в Терафлю Лар незначительно и он не может вызвать серьезных симптомов передозировки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Воздействия препарата на репродуктивную функцию и развитие плода в эксперименте обнаружено не было. Контролируемых исследований с участием беременных женщин не проводилось, в связи с чем не следует применять Терафлю Лар при беременности, особенно в первый триместр.

Нет клинических данных о проникновении активного компонента в материнское молоко. Тем не менее, препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Эффективность бензоксония хлорида снижается при одновременном приеме анионо-активных агентов, например, зубной пасты.

Алкоголь повышает абсорбцию бензоксония хлорида (следует избегать приема спиртных напитков во время проведения терапии).

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 4 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°С, в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/TeraFlyu_LAR