

## ТераФлю ЛАР (спрей)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бензоксония хлорид](#)
- [Лидокаин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>мнн</sup> [Википедия](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Спрей для местного применения** в виде прозрачного, бесцветного раствора с запахом мяты.

	<b>100 мл</b>
бензоксония хлорид	0.2%
лидокаина гидрохлорид	0.15%

*Вспомогательные вещества:* этанол 96% (об./об.) - 10%, глицерин - 15%, хлористоводородная кислота 0.1N - 0.0581%, масло мяты перечной - 0.01%, ментол - 0.0025%, вода очищенная - до 100%.

30 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) в комплекте с насадкой-распылителем - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный для местного применения, содержит антисептическое средство и местноанестезирующее средство.

*Бензоксония хлорид* - соль четвертичного аммония: N-бензил N-додецил N, N-ди(2-гидроксиэтил) аммония хлорид. Благодаря катионной структуре обладает мембранотропной активностью и оказывает выраженное антибактериальное действие на грамположительные и, в меньшей степени, на грамотрицательные микроорганизмы. Также обладает противогрибковой и противовирусной активностью в отношении мембранных вирусов (в т.ч. вирусов гриппа, парагриппа и герпеса).

## ТераФлю ЛАР (спрей)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Лидокаин* является местным анестетиком, который при воспалительных процессах уменьшает болезненные ощущения в горле при глотании.

### Фармакокинетика

*Бензоксония хлорид* практически не абсорбируется. Концентрация бензоксония хлорида практически не определяется. В тканях организма накопление активного вещества не обнаружено. Около 1% полученной дозы бензоксония хлорида обнаруживается в моче.

*Лидокаин* абсорбируется при приеме внутрь и через слизистую оболочку ротовой полости. Метаболизируется при "первом прохождении" через печень. При пероральном введении биодоступность составляет около 35%. Метаболиты лидокаина выводятся вместе с мочой, менее 10% активного вещества выводится в неизменном виде.

## Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки:

- фарингит;
- ларингит;
- катаральная ангина;
- стоматит;
- язвенный гингивит;
- хронический тонзиллит (в качестве вспомогательного средства).

## Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Язвенный гингивит](#)

## Противопоказания:

- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к аммиачным соединениям.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** назначают по 4 распыления (приблизительно 0.5 мл) 3-6 раз/сут.

**Детям в возрасте 4 лет и старше** назначают не более 2-3 распылений 3-6 раз/сут.

Длительность лечения - не более 5 дней. Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 5 дней терапии, пациент должен обратиться к врачу.

Спрей распыляют в ротовой полости, держа баллончик вертикально.

## Побочное действие:

Определение частоты побочных реакций: очень часто ( $\geq 10\%$ ); часто ( $\geq 1\%$ , но  $\leq 10\%$ ), нечасто ( $\geq 0.1\%$ , но  $\leq 1\%$ ), редко

## **ТераФлю ЛАР (спрей)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

( $\geq 0.01\%$ , но  $\leq 0.1\%$ ), очень редко ( $\leq 0.01\%$ ).

*Местные реакции:* нечасто - раздражение, носящее временный характер. При применении препарата более 2 недель может наблюдаться обратимая коричневая окраска языка или зубов.

*Аллергические реакции:* в единичных случаях - крапивница, отек лица, отек гортани.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* при случайном приеме препарата (как и других аммониевых соединений) в высоких дозах возможны тошнота, рвота. Содержание лидокаина в препарате незначительно и не может вызвать серьезных симптомов передозировки.

*Лечение:* рекомендуется выпить молока или съесть яичный белок, взбитый в воде.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

ТераФлю ЛАР противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Клинический опыт применения препарата при беременности очень ограничен.

Не имеется клинических данных о выделении активных веществ с грудным молоком.

В *экспериментальных исследованиях* не обнаружено влияния препарата на репродуктивную функцию и развитие плода.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Эффективность бензоксония хлорида уменьшается при одновременном использовании анионно-активных средств, например, зубной пасты.

Этанол повышает абсорбцию бензоксония хлорида.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время применения препарата ТераФлю ЛАР следует избегать употребления алкоголя.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано: детский возраст до 4 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/TeraFlyu\\_LAR\\_sprey](http://drugs.thead.ru/TeraFlyu_LAR_sprey)

---

