

## ТераФлю от гриппа и простуды



### Код АТХ:

- [N02BE51](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аскорбиновая кислота](#)
- [Парацетамол](#)
- [Фенилэфрин](#)
- [Фенирамин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный)** белого цвета с желтыми вкраплениями, сыпучий, гранулированный, без посторонних частиц, с цитрусовым запахом; допускается наличие мягких комков.

|                         | <b>1 пак.</b> |
|-------------------------|---------------|
| парацетамол             | 325 мг        |
| фенирамина малеат       | 20 мг         |
| фенилэфрина гидрохлорид | 10 мг         |
| аскорбиновая кислота    | 50 мг         |

*Вспомогательные вещества:* натрия цитрата дигидрат - 120.74 мг, яблочная кислота - 50.31 мг, краситель солнечный закат желтый - 98 мкг, краситель хинолиновый желтый - 94 мкг, титана диоксид - 3.16 мг, ароматизатор лимонный - 208.42 мг, кальция фосфат трехосновной - 82 мг, лимонная кислота - 1221.79 мг, сахара - 20 г.

22.1 г - пакетики (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 или 25) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, обладает жаропонижающим, противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим и противоаллергическим действием.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата ТераФлю от гриппа и простуды не предоставлены.

### Показания к применению:

— симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ, в т.ч. гриппа), сопровождающихся высокой температурой, ознобом, ломотой в теле, головной и мышечной болью, насморком, заложенностью носа, чиханьем.

### Относится к болезням:

- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)
- [Насморк](#)

### Противопоказания:

- портальная гипертензия;
- алкоголизм;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО, бета-адреноблокаторов;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* при артериальной гипертензии, сахарном диабете, закрытоугольной глаукоме, тяжелых заболеваниях печени или почек, легких (в т.ч. при бронхиальной астме), затруднениях мочеиспускания при гиперплазии предстательной железы, заболеваниях крови, врожденных гипербилирубинемиях (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), гипертиреозе, феохромоцитоме.

### Способ применения и дозы:

Внутрь. Содержимое одного пакетика растворяют в 1 стакане кипяченной горячей воды. Принимают в горячем виде. Можно добавить сахар по вкусу. Повторную дозу можно принимать через каждые 4 ч (не более 3 доз в течение 24 ч).

ТераФлю от гриппа и простуды можно применять в любое время суток, но наилучший эффект приносит прием препарата перед сном, на ночь. Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

### Побочное действие:

*Аллергические реакции:* возможно - сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек.

*Со стороны нервной системы:* возможно - повышенная возбудимость, снижение скорости психомоторных реакций, чувство усталости, головокружение, нарушение сна.

*Со стороны пищеварительной системы:* возможно - сухость во рту, тошнота, рвота, боли в желудке.

*Со стороны мочевыделительной системы:* возможно - задержка мочи.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* возможно - ощущение сердцебиения, повышение АД.

*Со стороны органа зрения:* возможно - мидриаз, парез аккомодации, повышение внутриглазного давления.

*Эффекты, вызванные парацетамолом:* нарушения системы кроветворения (анемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз), при длительном приеме в высоких дозах возможны гепатотоксическое и нефротоксическое действие, гемолитическая анемия, метгемоглобинемия, панцитопения.

Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются, или возникли любые другие побочные эффекты, пациент должен сообщить об этом врачу.

### **Передозировка:**

*Симптомы* (обусловлены действие парацетамола, проявляются после приема более 10-15 г): бледность кожных покровов, снижение аппетита, тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, в тяжелых случаях - печеночная недостаточность, гепатонекроз, повышение активности печеночных трансаминаз, увеличение протромбинового времени, энцефалопатия и коматозное состояние.

*Лечение:* промывание желудка, активированный уголь в первые 6 ч, введение донаторов SH-групп и предшественников синтеза глутатиона - метионина через 8-9 ч после передозировки и ацетилцистеина через 12 ч.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применять ТераФлю от гриппа и простуды при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата у этой категории пациентов.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Рекомендуется воздержаться от приема препарата при приеме ингибиторов MAO, седативных средств, этанола.

Риск гепатотоксического действия парацетамола повышается при одновременном применении барбитуратов, фенитоина, карбамазепина, рифампицина, зидовудина и других индукторов микросомальных ферментов печени.

Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические средства, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров.

ГКС увеличивают риск повышения внутриглазного давления.

Парацетамол снижает эффективность урикозурических препаратов и повышает эффективность непрямых антикоагулянтов. Трициклические антидепрессанты усиливают симпатомиметическое действие.

Одновременное применение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии.

Фенилэфрин снижает гипотензивное действие гуанетидина, который в свою очередь усиливает альфа-адреномиметический эффект фенилэфрина.

Этанол может усиливать седативное действие фенирамина.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Во избежание токсического поражения печени препарат не следует сочетать с применением алкогольных напитков.

Не следует использовать препарат из поврежденных пакетиков.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При приеме препарата не рекомендуется управлять автомобилем или другими механизмами.

#### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью при тяжелых заболеваниях почек.

#### **При нарушениях функции печени**

## **ТераФлю от гриппа и простуды**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

С осторожностью при тяжелых заболеваниях печени.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 12 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/TeraFlyu\\_ot\\_grippa\\_i\\_prostudy](http://drugs.thead.ru/TeraFlyu_ot_grippa_i_prostudy)