

## [Терафлекс Хондрокрем Форте](#)



### **Код АТХ:**

- [M02AX10](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Мелоксикам](#)
- [Хондроитина сульфат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

Крем для наружного применения, 1% + 5%. По 10, 20, 25, 30, 50 или 100 г в тубе алюминиевой. Каждую тубу помещают в пачку из картона.

### **Состав:**

Крем для наружного применения	1 г
<i>активные вещества:</i>	
хондроитина сульфат натрия	50 мг
мелоксикам	10 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> диметилсульфоксид — 100 мг; пропиленгликоль — 100 мг; макрогола цетостеарат — 12 мг; цетостеариловый спирт (цетиловый спирт — не более 60%, стеариловый	

спирт — не менее 40%) — 42 мг; парафин жидкий — 100 мг; вазелин — 80 мг; имидомочевина — 3 мг; натрия дисульфит — 0,5 мг; вода — до 1 г
---

## Описание:

Крем от светло-желтого с зеленоватым оттенком до желтого с зеленоватым оттенком цвета с запахом диметилсульфоксида.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное местное, обезболивающее местное, хондропротективное.

### Фармакодинамика

Препарат Терафлекс® Хондрокрем Форте обладает комбинированным действием: замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза, оказывает обезболивающее действие, способствует увеличению объема движения суставов (в области нанесения крема), обладает противовоспалительным действием, уменьшает припухлость суставов. Благодаря оптимальному сочетанию компонентов крема отмечается взаимное усиление их обезболивающего и противовоспалительного эффектов.

*Хондроитина сульфат* — высокомолекулярный мукополисахарид, который является естественным компонентом хрящевой ткани. Хондроитина сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует регенерации (восстановлению) хрящевых поверхностей суставов, ускоряет процессы их репарации, препятствует коллапсу соединительной ткани. Это приводит к уменьшению болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов.

*Мелоксикам* — НПВС — обладает противовоспалительным, анальгетическим действием. Мелоксикам избирательно ингибирует ЦОГ-2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает в очаге воспаления количество ПГ (медиаторов боли и воспаления). Мелоксикам является хондронейтральным препаратом, не оказывает негативное влияние на хрящевую ткань, не влияет на синтез протеогликана хондроцитами суставного хряща.

## Показания к применению:

Препарат рекомендуется к применению в составе комплексной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата:

- остеоартроза, остеохондроза позвоночника;
- иных заболеваний суставов, сопровождающихся болевым синдромом.

## Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Остеохондроз](#)

## Противопоказания:

- нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения;
- детский возраст до 12 лет;
- гиперчувствительность к компонентам препарата (а также к другим НПВС).

*С осторожностью:* при нарушении функции почек и печени, при выраженной патологии ЖКТ (язвенная болезнь в фазе обострения), при выраженной патологии системы крови, пожилой возраст.

## **Способ применения и дозы:**

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения - 2-3 раза/сут. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. После нанесения препарата руки необходимо тщательно вымыть. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта. После 2 недель использования препарата следует проконсультироваться с врачом.

## **Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции со стороны кожи (зуд, покраснение, кожная сыпь).

При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение крема и обратиться к врачу.

## **Передозировка:**

Крайне низкая системная абсорбция активных компонентов препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания препарата на глаза и слизистые оболочки.

Следует проконсультироваться с врачом перед совместным применением Терафлекс Хондрокрем Форте с другими НПВС, а также при необходимости использования препарата более 2 недель.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не вызывает седативного эффекта, психомоторных нарушений и не влияет на способность пациента заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрой психических и двигательных реакций.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

## **Терафлекс Хондрокрем Форте**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Terafleks\\_Hondrokrem\\_Forte](http://drugs.thead.ru/Terafleks_Hondrokrem_Forte)