Терафлекс М



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения*** желтовато-белого цвета, вязкий, с запахом камфоры и ментола.

	1 г
глюкозамина гидрохлорид	3 мг (0.3%)
хондроитин сульфат	8 мг (0.8%)
камфора	32 мг (3.2%)
масло мяты перечной	9 мг (0.9%)

Вспомогательные вещества: алоэ древовидное, цетиловый спирт, ланолин, метилпарагидроксибензоат, макрогол 100 стеарат, пропиленгликоль, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная, диметикон.

28.4 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
56.7 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с улучшающим регенерацию хрящевой ткани и противовоспалительным действием для наружного применения.

Хондроитин сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, принимающим участие в построении хрящевой ткани. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ и стимулирует его регенерацию. При ранних стадиях воспалительного процесса хондроитин сульфат снижает его активность и таким образом замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует снижению интенсивности болевого синдрома, улучшению функции суставов, уменьшает потребность в НПВС.

Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит гликозаминогликанов в организме, принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Глюкозамина гидрохлорид селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование супероксидных радикалов и ферментов, повреждающих хрящевую ткань (коллагеназы и фосфолипазы).

Камфора при местном применении раздражает чувствительные нервные окончания кожи и подкожных тканей, расширяет поверхностные сосуды, вызывает ощущение жара, улучшает кровоснабжение кожи и подкожных тканей, оказывает умеренное антисептическое действие.

Масло мяты перечной при местном применении оказывает умеренное антисептическое, противовоспалительное, анестезирующее и отвлекающее действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Терафлекс М не предоставлены.

Показания к применению:

— дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (в т.ч. остеоартроз и остеохондроз).

Относится к болезням:

- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Остеохондроз

Противопоказания:

— повреждение кожных покровов;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат детям.

Способ применения и дозы:

Полоску крема длиной 2-3 см наносят на кожу над местом поражения 2-3 раза/сут и втирают до полного всасывания.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Передозировка препарата Терафлекс М не описана. В случае передозировки рекомендуется симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о влиянии местного использования крема Терафлекс М на фармакодинамику и фармакокинетику других лекарственных средств отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Терафлекс М не следует наносить на поврежденные участки кожи.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 27°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Terafleks_M