

## [Терафлю Кв](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь** в виде прозрачного раствора от бесцветного до бледно-желтого цвета, с запахом аниса.

	<b>1 мл</b>
Гвайфенезин	100 мг

*Вспомогательные вещества:* масло анисовое, анетол, этанол 96%, глицерол, сахарин.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

◇ **Сироп** прозрачный, слегка опалесцирующий, светло-коричневого цвета, с запахом лакрицы.

	<b>5 мл</b>
Гвайфенезин	100 мг

*Вспомогательные вещества:* ароматизатор IFF 12Н 310, этанол 96%, глицерол, натрия сахарин, сорбитол 70%, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла (1) с колпачком-дозатором - пачки картонные.

200 мл - флаконы темного стекла (1) с колпачком-дозатором - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Отхаркивающее средство. Муколитическое действие гвайфенезина основано на снижении поверхностного натяжения и прилипания мокроты к слизистой бронхов и снижении ее вязкости за счет деполимеризации кислых мукополисахаридов слизи. Одновременно гвайфенезин обладает характерной для отхаркивающих средств способностью увеличивать секрецию слизи за счет стимуляции секреторных клеток слизистой бронхов, вырабатывающих нейтральные полисахариды. Наряду с разжижением бронхиального секрета и снижением вязкости мокроты активизируется цилиарный аппарат бронхов, что способствует усилению удаления мокроты и переходу непродуктивного кашля в продуктивный.

Длительность действия при однократном приеме - 3.5-4 ч.

#### **Фармакокинетика**

##### *Всасывание*

Абсорбция гвайфенезина из ЖКТ происходит быстро - через 25-30 мин после приема внутрь, время достижения  $C_{max}$  - 15-30 мин после приема внутрь.

##### *Распределение*

Связывание с белками плазмы - около 37%. Гвайфенезин проникает в ткани, содержащие кислые мукополисахариды.

#### Метаболизм

Метаболизируется в печени. Главный метаболит -  $\beta$ -(2-метоксифенокси) молочная кислота.

#### Выведение

$T_{1/2}$  гвайфенезина из плазмы крови - 1 ч. Выводится легкими с мокротой и почками как в неизменном виде, так и в виде неактивных метаболитов (главным образом в виде глюкуронидов и сульфонатов).

## Показания к применению:

— заболевания дыхательных путей с затрудненным отхождением вязкой мокроты: фарингит, синусит, грипп, острый трахеит, бронхит различной этиологии, бронхоэктазы, бронхиальная астма, туберкулез легких, пневмония, муковисцидоз;

— санация бронхиального дерева в пред- и послеоперационном периодах.

## Относится к болезням:

- [Астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Бронхоэктазия](#)
- [Грипп](#)
- [Муковисцидоз](#)
- [Пневмония](#)
- [Синусит](#)
- [Трахеит](#)
- [Туберкулез](#)
- [Фарингит](#)

## Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;

— желудочное кровотечение (в анамнезе);

— влажный кашель с обильным отхождением мокроты;

— детский возраст до 2 лет (для капель);

— детский возраст до 18 лет (для сиропа);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат в форме капель при персистирующем или хроническом кашле на фоне бронхиальной астмы или с повышенным отделением мокроты (назначение гвайфенезина требует тщательного врачебного контроля); в форме сиропа - у пациентов с печеночной недостаточностью, эпилепсией, заболеваниями ЦНС (содержит этанол).

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь.

Сироп назначают **взрослым** по 5-10 мл 4 раза/сут.

Капли перед применением разбавляют в воде или травяном отваре или капают на кусочек сахара.

**Детям в возрасте 2-3 лет** назначают по 8-10 капель 2 раза/сут; **3-6 лет** - по 12-15 капель 2 раза/сут; **6-12 лет** - по 15-20 капель 3-4 раза/сут.

**Взрослым и детям старше 12 лет** - по 20-30 капель 3-4 раза/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, гастралгия, абдоминальные боли, диарея.

*Со стороны ЦНС:* головокружение, головная боль, сонливость.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, крапивница, повышение температуры.

## Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять препарат в форме капель при беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат совместим с бронхолитиками, противомикробными средствами, сердечными гликозидами.

Кодеин затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

## Особые указания и меры предосторожности:

Одновременно с лечением рекомендуется обильное питье (настои, отвары лекарственных трав, фруктовые соки и т.д.). Целесообразно сочетать с постуральным дренажем или вибрационным массажем грудной клетки.

При постоянном кашле необходимость применения гвайфенезина врач определяет индивидуально. Если после 7 дней приема препарата кашель сохраняется или наряду с кашлем отмечаются гипертермия, кожная сыпь, длительная головная боль, боль в горле, пациент должен проконсультироваться с врачом.

Возможно окрашивание мочи в розовый цвет.

Результаты определения 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче (при использовании нитрозоафтольного реактива) могут быть ложно завышены вследствие влияния метаболитов гвайфенезина на цвет (прием гвайфенезина следует прекращать за 48 ч до сбора мочи для данного теста).

Гвайфенезин и его метаболиты могут вызывать изменение цвета при определении ванилилминдальной кислоты в моче и ложно завышать результата теста с ней на катехины. Прием гвайфенезина следует прекращать за 48 ч до сбора мочи для данного теста.

*Использование в педиатрии*

Не изучена эффективность и безопасность применения препарата в форме капель у **детей в возрасте до 2 лет**, в форме сиропа - у **детей в возрасте до 18 лет**.

### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью следует назначать Терафлю КВ в форме сиропа пациентам с печеночной недостаточностью.

### **Применение в детском возрасте**

Не изучена эффективность и безопасность применения препарата в форме капель у **детей в возрасте до 2 лет**, в форме сиропа - у **детей в возрасте до 18 лет**.

**Детям в возрасте 2-3 лет** назначают по 8-10 капель 2 раза/сут; **3-6 лет** - по 12-15 капель 2 раза/сут; **6-12 лет** - по 15-20 капель 3-4 раза/сут.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Teraflyu\\_Kv](http://drugs.thead.ru/Teraflyu_Kv)