Терасил

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания апельсиновые*** темно-оранжевого цвета, круглые, выпуклой формы с обеих сторон, с характерным вкусом апельсина и охлаждающим эффектом; имеют слегка неровную поверхность, в карамельной массе имеются мелкие воздушные пузырьки в виде включений, что свойственно лекарственным формам из карамельной массы.

	1 таб.
амилметакрезол	600 мкг
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, сахарный сироп, вода очищенная, натрия хлорид, натрия сахаринат, лимонная кислота, краситель хинолин желтый, левоментол, масло апельсина, масло апельсина концентрированное, масло листьев эвкалипта.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
30 шт. - индивидуальная упаковка (30) - контейнеры пластиковые.

◊ ***Таблетки для рассасывания медово-лимонные*** красно-коричневого цвета, круглые, выпуклой формы с обеих сторон, с характерным вкусом лимона и охлаждающим эффектом; имеют слегка неровную поверхность, в карамельной массе имеются мелкие воздушные пузырьки в виде включений, что свойственно лекарственным формам из карамельной массы.

	1 таб.
амилметакрезол	600 мкг
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, сахарный сироп, вода очищенная, натрия сахаринат, левоментол, лимонная кислота, краситель хинолин желтый, краситель коричневый шоколадный, ароматизатор медово-лимонный.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
30 шт. - индивидуальная упаковка (30) - контейнеры пластиковые.

◊ ***Таблетки для рассасывания черносмородиновые*** от фиолетового до красно-фиолетового цвета, круглые, выпуклые с обеих сторон, с характерным вкусом черной смородины и охлаждающим эффектом; имеют слегка неровную поверхность, в карамельной массе имеются мелкие воздушные пузырьки в виде включений, что свойственно лекарственным формам из карамельной массы.

	1 таб.
амилметакрезол	600 мкг
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, сахарный сироп, вода очищенная, натрия сахаринат, лимонная кислота, краситель пунцовый, краситель патентованный синий, левоментол, ароматизатор черносмородиновый.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
30 шт. - индивидуальная упаковка (30) - контейнеры пластиковые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный антисептик для местного применения в ЛОР-практике. Обладает антисептическим действием. *Активен в отношении* грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Терасил не предоставлены.

Показания к применению:

— лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (для облегчения боли и смягчения раздражения в горле).

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— сахарный диабет;

— детский возраст (до 6 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 6 лет препарат следует медленно рассасывать во рту по 1 таб. каждые 2-3 ч. Не применять более 8 таб. в течение 24 ч.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: возможен дискомфорт со стороны ЖКТ.

Лечение: при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Передозировка препарата Терасил маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) применение препарата возможно только в том случае, когда потенциальная польза терапии для матери превышает потенциальный вред для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Терасил с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении больным сахарным диабетом необходимо иметь в виду, что 1 таб. содержит около 2.6 г сахарозы.

Пациента следует предупредить, что если состояние не улучшается в течение 2 дней, следует обратиться к врачу.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Terasil