Теравит



Код АТХ:

- A11AA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** красно-коричневого цвета, овальные, двояковыпуклые; на изломе - от белого до светло-коричневого цвета с вкраплениями белого цвета.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. A)	4000 МЕ
бетакаротен (вит. A)	1000 МЕ
α-токоферола ацетат (вит. E)	30 МЕ
колекальциферол (вит. D_3)	400 МЕ
аскорбиновая кислота (вит. C)	90 мг
тиамина мононитрат (вит. B_1)	3 мг
рибофлавин (вит. B_2)	3.4 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. B_5)	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	3 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	400 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	9 мкг
никотинамид (вит. PP)	20 мг
биотин (вит. H)	30 мкг
калий (в форме хлорида)	7.5 мг
кальций (в форме дикальция фосфата)	40 мг
магний (в форме оксида)	100 мг
фосфор (в форме дикальция фосфата)	31 мг
железо (в форме фумарата)	27 мг
медь (в форме сульфата)	2 мг
цинк (в форме оксида)	15 мг
марганец (в форме сульфата)	5 мг
йод (в форме калия йодида)	150 мкг
молибден (в форме натрия молибдата)	15 мкг
селен (в форме натрия селената)	10 мкг
хром (в форме хлорида)	15 мкг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, магния стеарат, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид, крахмал.

Состав оболочки: желатин, гидроксипропилметилцеллюлоза, маннитол, титана диоксид, красный лаковый №40, голубой лаковый №2.

30 шт. - флаконы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий витамины, минералы и микроэлементы; действие обусловлено свойствами, входящими в его состав ингредиентами.

Показания к применению:

— профилактика и лечение гипо- и авитаминозов;

— недостатка минеральных веществ у взрослых;

— при несбалансированном или неполноценном питании;

— в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст.

Способ применения и дозы:

По 1 таблетке в день после еды. Курс лечения препаратом 30 дней. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендованную дозировку. Не рекомендуется применять Теравит совместно с препаратами, содержащими витамины, во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет из-за наличия в составе препарата рибофлавина.

Применение в детском возрасте

Запрещено использовать данный препарат в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Teravit