

## Теравит Прегна



### Код АТХ:

- [A11AA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые оболочкой** светло-коричневого цвета, овальные, двояковыпуклые, с насечкой с одной стороны.

	<b>1 таб.</b>
ретинола пальмитат (вит. А)	1500 МЕ
бетакаротен (вит. А)	1500 МЕ
D,L-α-токоферола ацетат (вит. Е)	30 МЕ
колекальциферол (вит. D <sub>3</sub> )	250 МЕ
аскорбиновая кислота (вит. С)	100 мг
тиамина мононитрат (вит. В <sub>1</sub> )	3 мг
рибофлавина гидрохлорид (вит. В <sub>2</sub> )	3.4 мг
кальция пантотенат (вит. В <sub>5</sub> )	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В <sub>6</sub> )	10 мг
фолиевая кислота (вит. В <sub>9</sub> )	1 мг
цианокобаламин (вит. В <sub>12</sub> )	12 мкг
биотин (вит. Н)	30 мкг
ниацин	20 мг
кальций (в форме цитрата)	46 мг
магний (в форме оксида)	150 мг
железо (в форме fumarata)	60 мг
медь (в форме оксида)	2 мг
цинк (в форме оксида)	25 мг
марганец (в форме сульфата)	5 мг
йод (в форме калия йодида)	150 мкг
молибден (в форме натрия молибдата)	25 мкг
селен (в форме натрия селената)	25 мкг
хром (в форме хлорида)	25 мкг

**Вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая, желатин, стеариновая кислота, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, поливинилпирролидон (повидон), кремния диоксид, сахароза, крахмал кукурузный, аскорбил пальмитат, натрия аскорбат, кальция гидрофосфат.

**Состав оболочки:** гидроксипропилметилцеллюлоза, титана диоксид, магния силикат, полиэтиленгликоль, железа

## Теравит Прегна

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

оксид, масло минеральное.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий витамины, минералы, микроэлементы. Действие обусловлено свойствами входящих в его состав ингредиентов.

### Показания к применению:

— восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ в период подготовки к беременности, во время беременности и в послеродовой период;

— анемия беременных.

### Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— возраст до 18 лет;

— повышенное содержание железа в организме (гемохроматоз, гемосидероз);

— нарушение утилизации железа (талассемия).

*С осторожностью:* при тяжелых заболеваниях почек и печени, остром панкреатите, недавно перенесенном инфаркте миокарда, гипертонической болезни.

### Способ применения и дозы:

Принимать по 1 таб./сут во время или после еды. Курс лечения 30 дней.

С лечебной целью применяют по рекомендации врача

### Побочное действие:

Аллергические реакции (зуд кожных покровов, сыпь), диспептические явления со стороны ЖКТ.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение по показаниям.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Прием одновременно с антацидными препаратами приводит к уменьшению абсорбции железа.

Витамин В<sub>6</sub> подавляет действие леводопы.

## **Теравит Прегна**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Не рекомендуется одновременный прием с поливитаминово-минеральными комплексами и препаратами железа во избежании передозировки.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Возможно ярко желтое окрашивание мочи, что совершенно безвредно и обусловлено наличием в составе препарата рибофлавина, железо может вызвать серо-черное окрашивание кала.

Так как витамин А в высоких дозах обладает тератогенным эффектом, в период беременности следует избегать бесконтрольного приема содержащих его препаратов.

#### ***При нарушениях функции почек***

С осторожностью: при тяжелых заболеваниях почек.

#### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью: при тяжелых заболеваниях печени.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: возраст до 18 лет.

### **Условия хранения:**

В сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Teravit\\_Pregna](http://drugs.thead.ru/Teravit_Pregna)