# Тербифин (крем)



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 1%*** белого или почти белого цвета, однородный.

| | **1 г** |
|---|---|
| тербинафина гидрохлорид | 10 мг |

*Вспомогательные вещества:* цетостеариловый спирт, цетомакрогол 1000, глицерил моностеарат, диметикон, полоксамер, парафин жидкий, бензиловый спирт, парафин, динатрия эдетат, пропиленгликоль, троламин, вода очищенная.

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Тербифин - противогрибковый препарат для местного применения, представляет собой аллиламин и обладает широким спектром противогрибкового действия, Тербинафин оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных грибов. Активность в отношении дрожжеподобных грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической.

Тербинафин нарушает происходящий в грибах биосинтез эргостерола на ранних стадиях. Это ведет к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы, расположенного на клеточной мембране гриба. Этот фермент не относится к системе цитохрома Р450. Тербинафин не оказывает влияния на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.

***Фармакокинетика***

При местном применении крема всасывается менее 5% дозы, таким образом, системное воздействие препарата минимально.

## Показания к применению:

— грибковые инфекции кожи, вызванные дерматофитами, такими как Trichophyton (например, T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum;

— дрожжевые инфекции кожи, в основном те, которые вызываются родом Candida (например, Candida albicans);

— разноцветный лишай (Pityriasis versicolor), вызываемый Pityrosporum orbiculare (также известный под названием Malassezia furfur).

## Относится к болезням:

- Дерматит
- Дерматофития
- Инфекции
- Лишай
- Разноцветный лишай

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к тербинафину или к любому другому компоненту, входящему в состав крема.

## Способ применения и дозы:

**Взрослые и дети с 12 лет и старше:**

Препарат наносят на кожу один или два раза в сутки. Перед нанесением крема необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Крем накладывают тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки и слегка втирают.

При инфекциях, сопровождающихся опрелостью (под молочными железами, в межпальцевых промежутках, между ягодицами, в паховой области), места нанесения крема можно прикрывать марлей, особенно на ночь.

*Средняя продолжительность лечения:*

Дерматомикоз туловища, голеней: 1 неделя 1 раз в день

Дерматомикоз стоп: 1 неделя 1 раз в день

Кандидоз кожи: 1-2 недели 1 или 2 раза в день

Разноцветный лишай: 2 недели 1 или 2 раза в день

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекции. В случае, если через две недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует провести верификацию диагноза.

**Применение препарата у лии пожилого возраста**

Нет оснований предполагать, что для лиц пожилого возраста требуется изменять дозирование препарата или что у них отмечаются побочные действия, отличающиеся от таковых у пациентов более молодого возраста.

**Применение препарата у детей**

Не рекомендуется применение данного препарата детям до 12 лет.

## Побочное действие:

В месте нанесения препарата в редких случаях отмечалось покраснение, опгущение зуда или жжения в месте нанесения крема, однако эти явления редко приводили к необходимости прекращать лечение. Эти вышеназванные симптомы следует отличать от аллергических реакций, например, крапивницы, которые возникают редко, однако, при их появлении необходимо прекратить лечение.

## Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось. Если же случайно препарат будет принят внутрь, можно ожидать развития таких же побочных явлений, как и при передозировке таблеток тербифина: тошнота, нарушение аппетита, боли в верхней половине живота, диарея.

*Лечение:* активированный уголь, при необходимости - симптоматическая поддерживающая терапия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В экспериментальных исследованиях тератогенных свойство тербинафина выявлено не было. До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении Тербифина. Однако, поскольку клинический опыт применения Тербифина у беременных женщин очень ограничен, его следует применять только по строгим показаниям.

Тербинафин выделяется с грудным молоком. Однако, в случае применения кормящей матерью Тербифина крема через кожу всасывается небольшое количество активного вещества, поэтому неблагоприятное воздействие на младенца маловероятно.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время лекарственные взаимодействия не известны.

## Особые указания и меры предосторожности:

Крем предназначен только для наружного использования. Следует избегать попадания препарата в глаза.

***Применение в пожилом возрасте***

Нет оснований предполагать, что для лиц пожилого возраста требуется изменять дозирование препарата или что у них отмечаются побочные действия, отличающиеся от таковых у пациентов более молодого возраста.

***Применение в детском возрасте***

Не рекомендуется применение данного препарата детям до 12 лет.

## Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Terbifin_krem