

## Теризидон-Мак



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, активен в отношении *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium avium*, а также *Staphylococcus aureus* и *Staphylococcus epidermidis*.

Также чувствительны: *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Morganella morganii*, *Klebsiella pneumoniae* и *Pseudomonas aeruginosa*.

Развитие вторичной резистентности отмечается редко. Перекрестной устойчивости с другими противотуберкулезными лекарственными средствами не наблюдается.

#### **Фармакокинетика**

Всасывание из ЖКТ - 70-90% (прием пищи не влияет на скорость всасывания). Время достижения  $C_{max}$  - 2-3 ч. Эффективная  $C_{min}$ : для микобактерий туберкулеза - 10-40 мг/л, для стафилококков - 8-32 мг/л, для грамотрицательных бактерий (имеющих клиническое значение) - 20-250 мг/л.

Хорошо распределяется в тканях и жидкостях организма (легкие, желчь, асцитическая жидкость, плевральный выпот, синовиальная жидкость, лимфа, мокрота).

Проникает в СМЖ (80-100% от концентрации в сыворотке), более высокая концентрация в СМЖ создается при воспалительных изменениях мозговых оболочек.

Метаболизируется незначительно.

$T_{1/2}$  - 21 ч. Выводится почками (в неизменном виде - 60-70%), кишечником (незначительное количество в неизменном виде и в виде метаболитов).

### Показания к применению:

— туберкулез различных форм и локализаций в составе комплексной терапии резистентных форм заболевания.

### Относится к болезням:

- [Туберкулез](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность (в т.ч. к циклосерину);
- органические заболевания ЦНС (в т.ч. церебросклероз);
- эпилепсия;
- психические нарушения;
- алкоголизм;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 14 лет).

*С осторожностью:* пожилой возраст, хроническая сердечная недостаточность, ХПН.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, независимо от приема пищи: **взрослым и детям старше 14 лет и массой тела менее 60 кг** - по 300 мг 2 раза/сут (600 мг/сут); **с массой тела 60-80 кг** - по 300 мг 3 раза/сут (900 мг/сут). **Взрослым с массой тела более 80 кг** - по 600 мг 2 раза/сут (1200 мг/сут). Принимают в течение 3-4 мес.

При **КК менее 30 мл/мин** дозу и кратность приема снижают.

## Побочное действие:

*Со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, тремор, бессонница, чувство опьянения; в единичных случаях - эпилептиформные судороги, депрессия, психоз.

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - абдоминальная боль, метеоризм, диарея.

*Аллергические реакции.*

## Передозировка:

*Симптомы:* усиление нейротоксичности (в т.ч. эпилептиформные припадки), нарушение функции ЖКТ.

*Лечение:* симптоматическое, активированный уголь, противосудорожные, седативные лекарственные средства. Гемодиализ эффективен.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Этанол повышает риск развития эпилептических припадков.

При одновременном применении с этионамидом повышается риск возникновения побочных эффектов со стороны ЦНС (особенно судорог).

Одновременное применение с изониазидом повышает частоту возникновения головокружения, сонливости.

## Особые указания и меры предосторожности:

Теризидон может вызвать дефицит цианокобаламина и/или фолиевой кислоты, необходимо провести

соответствующее обследование и лечение.

Следует ежемесячно контролировать показатели крови и мочи, функцию печени (АЛТ, АСТ, билирубин).

Необходимо избегать употребления этанола, т.к. одновременный прием с теризидоном повышает частоту побочных эффектов (вплоть до развития судорог).

В связи с возможностью развития побочных реакций со стороны нервной системы (депрессия, изменение поведения), необходимо контролировать психический статус пациента.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью: ХПН.

При **КК менее 30 мл/мин** дозу и кратность приема снижают.

#### **Применение в пожилом возрасте**

С осторожностью: пожилой возраст.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказание — детский возраст (до 14 лет).

**Детям старше 14 лет и массой тела менее 60 кг** назначают по 300 мг 2 раза/сут (600 мг/сут); **с массой тела 60-80 кг** - по 300 мг 3 раза/сут (900 мг/сут).

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Terizidon-Mak>