

## Термикон



### Код АТХ:

- [D01AE15](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тербинафин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей для наружного применения 1%** в виде прозрачной, бесцветной или светло-желтой жидкости с характерным запахом этилового спирта.

	<b>1 мл</b>
тербинафина гидрохлорид	10 мг

*Вспомогательные вещества:* этанол ректификованный, пропиленгликоль, полоксамер (проксанол 268), вода очищенная.

30 г - флаконы полипропиленовые (1) с дозирующим насосом, насадкой и защитным колпачком - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противогрибковый препарат, аллиламин. Обладает широким спектром противогрибкового действия.

Активен в отношении дерматофитов: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton tonsurans*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*. В низких концентрациях оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые грибы (в т.ч. *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Scopulariopsis brevicaulis*) и некоторых диморфных грибов. На дрожжевые грибы рода *Candida* (главным образом *Candida albicans*) и их мицелиальные формы, в зависимости от вида, препарат оказывает фунгицидное или фунгистатическое действие.

Термикон нарушает ранний этап биосинтеза основного компонента клеточной мембраны гриба эргостерола путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы. Это ведет к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы, расположенного на клеточной мембране гриба.

#### Фармакокинетика

При наружном применении спрея всасывается менее 5% дозы, таким образом системное воздействие препарата минимально.

### Показания к применению:

— профилактика и лечение грибковых инфекций кожи, в т.ч. микозов стоп, паховой эпидермофитии (*tinea cruris*), грибковых поражений гладкой кожи тела (*tinea corporis*), вызванных такими дерматофитами как *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton tonsurans*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*, *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*;

— разноцветный лишай, вызываемый *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*).

### Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Эпидермофития](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при почечной и/или печеночной недостаточности, алкоголизме, угнетении костномозгового кроветворения, опухолях, болезнях обмена веществ, окклюзионных заболеваниях сосудов конечностей, у детей в возрасте до 12 лет.

### Способ применения и дозы:

Длительность курса лечения и режим дозирования устанавливается индивидуально и зависит от локализации процесса и тяжести заболевания.

Наружно препарат назначают **взрослым** 1-2 раза/сут, в зависимости от показаний. Перед нанесением препарата необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Препарат распыляют на пораженную кожу и прилегающие участки в количестве, достаточном для их увлажнения, и, кроме того, наносят на прилегающие участки интактной кожи.

Показания	Продолжительность лечения	Кратность применения препарата
Дерматомикоз туловища, голеней	1 неделя	1 раз/сут
Дерматомикоз стоп	1 неделя	1 раз/сут
Разноцветный лишай	1 неделя	2 раза/сут

Режим дозирования для **пациентов пожилого возраста** такой же, как для взрослых более молодого возраста.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* возможно - покраснение, ощущение зуда или жжения.

*Возможны* аллергические реакции.

## Передозировка:

О случаях передозировки Термикона в форме спрея для наружного применения не сообщалось. При случайном приеме препарата внутрь, следует ожидать развития таких же побочных явлений, как и при приеме Термикона в форме таблеток (тошнота, рвота, боли в нижней части живота и эпигастральной области, головокружение). Следует также учитывать содержание в препарате этанола.

*Лечение:* активированный уголь, в случае необходимости - симптоматическая поддерживающая терапия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Термикон следует применять по строгим показаниям и в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В случае применения кормящей матерью Термикона через кожу всасывается небольшое количество активного вещества, поэтому неблагоприятное воздействие на младенца маловероятно.

В *экспериментальных исследованиях* тератогенное действие тербинафина не выявлено. До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении тербинафина.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время лекарственное взаимодействие Термикона неизвестно.

## Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что нерегулярное применение или досрочное окончание лечения повышает риск развития рецидива.

Если через 1 неделю лечения Термиконем не отмечается улучшения состояния, необходимо повторно определить возбудителя заболевания и его чувствительность к препарату.

При лечении препаратом следует соблюдать общие правила гигиены для предотвращения возможности повторного инфицирования через белье и обувь. В процессе (через 2 нед.) и в конце лечения необходимо производить противогрибковую обработку обуви, носков и чулок.

Термикон предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания препарата в глаза, поскольку он может вызвать раздражение. При случайном попадании глаза следует промыть проточной водой, а в случае развития стойкого раздражения пациент должен проконсультироваться с врачом. При случайном попадании препарата в дыхательные пути в случае появления каких-либо симптомов, особенно при их сохранении, пациент должен также проконсультироваться с врачом. Следует соблюдать осторожность при нанесении Термикона на поврежденные участки кожи, поскольку спирт, входящий в его состав, может вызвать раздражение.

При развитии аллергических реакций препарат следует отменить.

### *Использование в педиатрии*

Опыт применения Термикона в форме спрея у **детей в возрасте до 12 лет** ограничен.

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Тербинафин не влияет на способность к управлению автотранспортом и выполнению работы, требующей повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

**Пациентам с почечной недостаточностью** внутрь назначают 125 мг 1 раз/сут.

## **Термикон**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

С *осторожностью* следует назначать препарат наружно при почечной недостаточности

### ***При нарушениях функции печени***

С *осторожностью* следует назначать препарат внутрь и наружно при печеночной недостаточности.

### ***Применение в пожилом возрасте***

Режим дозирования для **пациентов пожилого возраста** такой же, как для взрослых более молодого возраста.

### ***Применение в детском возрасте***

С *осторожностью* следует применять препарат у детей в возрасте до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C; не замораживать.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Termikon>