

Термикон (крем)



Код АТХ:

- [D01AE15](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тербинафин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 1%** белый, однородный, со слабым специфическим запахом.

| | |
|-------------------------|-------|
| тербинафина гидрохлорид | 1 г |
| | 10 мг |

Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, цетилпальмитат, натрия гидроксид, сорбитана стеарат, стеариловый спирт, цетиловый спирт, полисорбат 60, изопропил миристат, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат для местного применения. Обладает широким спектром противогрибкового действия.

Активен в отношении дерматофитов: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton tonsurans*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*. В небольших концентрациях, помимо дерматофитов, тербинафин оказывает фунгицидное действие в отношении плесневых, дрожжевых (в основном *Candida albicans*) и определенных диморфных грибов (*Pityrosporum orbiculare*). Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической.

Тербинафин специфическим образом изменяет ранний этап биосинтеза стеролов, происходящего в грибах. Это ведет к дефициту эргостерола и внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента сквалэнэпоксидазы, расположенного на клеточной мембране гриба.

Термикон (крем)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Термикон не оказывает влияния на изоферменты системы цитохрома P450 у человека и, соответственно, на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.

Фармакокинетика

При местном применении абсорбция - менее 5%, оказывает незначительное системное действие.

Показания к применению:

- профилактика и лечение грибковых инфекций кожи, в т.ч. микозов стоп (*tinea pedis*), паховой эпидермофитии (*tinea cruris*), грибковых поражений гладкой кожи тела (*tinea corporis*), вызванных дерматофитами;
- дрожжевые инфекции кожи (в основном вызываемые *Candida albicans*), в частности, опрелость;
- разноцветный лишай (*Pityriasis versicolor*), вызываемый *Pityrosporum orbiculare*.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Эпидермофития](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при печеночной и/или почечной недостаточности, алкоголизме, угнетении костномозгового кроветворения, опухолях, болезнях обмена веществ, окклюзионных заболеваниях сосудов конечностей, у детей в возрасте до 12 лет (отсутствие достаточного клинического опыта).

Способ применения и дозы:

Термикон назначают наружно **взрослым и детям старше 12 лет**.

Перед нанесением крема необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Крем наносят 1-2 раза/сут тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки, слегка втирают.

При инфекциях, сопровождающихся опрелостью (под молочными железами, в межпальцевых промежутках, между ягодицами, в паховой области), места нанесения крема можно прикрывать марлей, особенно на ночь.

Средняя продолжительность лечения при *дерматомикозе туловища, голеней, стоп* - 1 раз/сут в течение 1 недели; при *кандидозе кожи* - 1-2 раза/сут в течение 1-2 недель; при *разноцветном лишае* - 1-2 раза/сут в течение 2 недель.

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекции. В случае, если через 1-2 недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует провести верификацию диагноза.

Режим дозирования препарата для **пациентов пожилого возраста** такой же как для пациентов других возрастных групп.

Побочное действие:

Местные реакции: в местах нанесения крема возможны покраснение, ощущение зуда или жжения, аллергические реакции.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось. Если Термикон случайно будет принят внутрь, можно ожидать

Термикон (крем)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

развития таких же симптомов, как и при передозировке таблеток: головная боль, тошнота, боли в эпигастрии и головокружение.

Лечение: активированный уголь, при необходимости - симптоматическая поддерживающая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении Термикона. Однако, поскольку клинический опыт применения Термикона при беременности очень ограничен, его следует применять только по строгим показаниям.

Тербинафин выделяется с грудным молоком. В случае применения кормящей матерью Термикона через кожу всасывается небольшое количество активного вещества, поэтому неблагоприятное воздействие на младенца маловероятно.

В экспериментальных исследованиях тератогенных свойств тербинафина выявлено не было.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данных о лекарственном взаимодействии Термикона не имеется.

Особые указания и меры предосторожности:

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения имеется риск рецидива инфекции.

Термикон предназначен только для наружного применения.

Следует избегать попадания его в глаза, поскольку он может вызвать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом.

При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применяют препарат при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

С осторожностью применяют препарат при печеночной недостаточности.

Применение в пожилом возрасте

Режим дозирования препарата для **пациентов пожилого возраста** такой же как для пациентов других возрастных групп.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью* следует применять препарат у детей в возрасте до 12 лет (отсутствие достаточного клинического опыта).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Термикон (крем)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Termikon_krem