Терридеказа



Код АТХ:

- D03BA

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для внутриполостного и наружного применения в виде пористой массы или порошка белого или белого с желтоватым цветом оттенка.

	1 амп.
протеаза (из культуры Aspergillus terricola)	100 ПЕ

100 ПЕ - ампулы (10) - пачки картонные.

Лиофилизат для приготовления раствора для внутриполостного и наружного применения в виде пористой массы или порошка белого или белого с желтоватым цветом оттенка.

	1 фл.
протеаза (из культуры Aspergillus terricola)	100 ПЕ

100 ПЕ - флаконы (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Терридеказа - протеолитический фермент, полученный путем ковалентного присоединения террилитина к окисленному полиглюкину.

Террилитин - микробный протеолитический фермент, получаемый из нативных растворов культуры Aspergillus terricola штамм Н-20, обладающий широким спектром специфического гидролитического действия в отношении различных белковых субстратов, используемый в качестве некролитического и ранозаживляющего средства для наружного применения.

Присоединение к террилитину полиглюкина значительно уменьшило аллергизирующее и местнораздражающее действие препарата.

Основной механизм действия обусловлен протеолитической активностью террилитина и его способностью гидролизовать различные белковые субстраты, в том числе муцин, а также оказывать фибринолитическое действие.

Фармакокинетика

Фармакокинетика для данного препарата не изучена.

Показания к применению:

— гнойные раны;

— пролежни;

— трофические язвы;

— абсцессы подкожной клетчатки различной локализации (после вскрытия, удаления нежизнеспособных тканей, тщательного дренирования полости абсцесса);

— эмпиема плевры;

— свернувшийся гематоракс;

— гнойные трахеобронхиты;

— бронхоэктатическая болезнь;

— застой мокроты после резекции легких.

Относится к болезням:

- Абсцесс
- Бронхит
- Бронхоэктатическая болезнь
- Гематомы
- Плеврит
- Пролежни
- Раны
- Трахеит
- Трахеобронхит
- Эмпиема
- Эмпиема плевры

Противопоказания:

— кровоточащие раны;

— кровоточащие язвы;

— изъязвленные поверхности злокачественных опухолей;

— одновременный прием тромболитических препаратов во избежание геморрагических осложнений;

— не вводить в очаги воспаления (до вскрытия);

— беременность, лактация;

— детский возраст до 18 лет;

— индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Терридеказу применяют в виде раствора, для чего содержимое флакона (ампулы) 100 ПЕ (Протеолитических Единиц) растворяют в 2-5 мл дистиллированной воды или 0,9 % растворе натрия хлорида, или 0,25 % растворе про каина.

Применяют наружно, внутриплеврально, вутритрахеалыю, внутрибронхиально.

На *гнойные раны, пролежни, трофические язвы* накладывают салфетки, смоченные раствором Терридеказы, сверху

накладывают водонепроницаемую повязку; смену повязки с препаратом производят один раз в сутки или через день.

При *открытой санации эмпиемы плевры* в плевральную полость вводят турунды с препаратом.

При *закрытой пункционной санации* раствор Терридеказы в дозе 100 ПЕ вводят внутриплеврально как в предоперационном, так и послеоперационном периодах 1 раз в сутки. Курс лечения - 2-7 процедур.

При *закрытом пункционном лечении постоперационного гематоракса* раствор Терридеказы вводят внутриплеврально в дозе 100-200 ПЕ в сутки курсами от 3-7 введений с аспирацией разжиженного экссудата (спустя 2-3 ч после введения фермента).

При *гнойном трахеобронхите* по 3-5 мл раствора Терридеказы (100 ПЕ) вводят через интубационную трубку (или внутритрахеально) 5-6 раз в день в течение 3-4 дней.

При *задержке мокроты в послеоперационном периоде после резекции легких* внутрибронхиально вводят 2-3 мл раствора Терридеказы (10-15 ПЕ), Для чего 100 ПЕ препарата растворяют в 20 мл 0,9 % раствора натрия хлорида.

Курс лечения 1 -3 процедуры.

Побочное действие:

Повышение температуры тела - связано с всасыванием продуктов протеолиза жизнеспособных тканей при недостаточном дренировании раны, аллергические реакции.

Передозировка:

Случаев передозировки не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность приема препарата при беременности и в период лактации при наружном и внутриполостном применении не изучена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Терридеказа способствует лучшему проникновению в очаг воспаления других лекарственных средств (гидроксиметилхиноксалиндиоксид, ампициллин+оксациллин, линкомицин).

Препарат совместим с противомикробными и химиотерапевтическими средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не применять внутривенно.

В случае возникновения осложнений следует создать условия для хорошего оттока гноя из раны, либо отменить препарат.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

О неблагоприятном влиянии на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не сообщалось.

Применение в детском возрасте

В связи с отсутствием данных о применении препарата в детском возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата не установлены), не следует назначать препарат без консультации врача.

Условия хранения:

При температуре от 0 до 10°С в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Terridekaza