

Тетрациклин С Нистатином



Код АТХ:

- [J01BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нистатин](#)
- [Тетрациклин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Показания к применению:

Инфекционные заболевания, вызванные чувствительной микрофлорой:

- пневмония;
- бронхит;
- трахеит;
- эмпиема плевры;
- холецистит;
- пиелонефрит;
- кишечные инфекции;
- коклюш;
- эндокардит;
- эндометрит;
- простатит;
- сифилис;

- гонорея;
- бруцеллез;
- риккетсиоз;
- гнойные инфекции мягких тканей;
- остеомиелит;
- трахома;
- конъюнктивит;
- блефарит;
- тонзиллит;
- отит;
- фарингит;
- фурункулез;
- экземы инфицированные;
- сыпь;
- угревая сыпь;
- фолликулит;
- профилактика послеоперационных инфекций.

Относится к болезням:

- [Блефарит](#)
- [Бронхит](#)
- [Гонорея](#)
- [Инфекции](#)
- [Коклюш](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Отит](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Плеврит](#)
- [Пневмония](#)
- [Простатит](#)
- [Сифилис](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахома](#)
- [Фарингит](#)
- [Фолликулит](#)
- [Фурункул](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Экзема](#)
- [Эмпиема](#)
- [Эмпиема плевры](#)
- [Эндокардит](#)
- [Эндометри](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность (III триместр);

Тетрациклин С Нистатином

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- период лактации;
- детский возраст (до 8 лет);
- печеночная недостаточность;
- лейкопения;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы:

Внутрь, запивая большим количеством жидкости, **взрослым** - по 250 мг 4 раза/сут, при необходимости - 2 г/сут.

Детям старше 8 лет - по 25 мг/кг 4 раза/сут.

Побочное действие:

Снижение аппетита, рвота, диарея, тошнота, глоссит, эзофагит, гастрит, изъязвление желудка и двенадцатиперстной кишки, дисфагия; фотосенсибилизация, аллергические реакции (макулопапулезная сыпь, гиперемия кожи, ангионевротический отек, анафилактикоидные реакции, лекарственная красная волчанка); гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нейтропения, суперинфекция (включая грибковые); кишечный дисбактериоз; гиповитаминоз В; повышение активности печеночных трансаминаз, гиперкреатининемия, азотемия, гипербилирубинемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность (III триместр); период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В связи с подавлением кишечной микрофлоры снижает протромбиновый индекс (требует коррекции дозы непрямых антикоагулянтов).

Снижает эффективность бактерицидных антибиотиков, нарушающих синтез клеточной стенки (пенициллины, цефалоспорины).

Абсорбцию снижают антациды, содержащие кальций, алюминий и/или магний, препараты железа.

Химотрипсин повышает концентрацию и продолжительность циркуляции.

Особые указания и меры предосторожности:

В связи с возможным развитием фотосенсибилизации необходимо ограничение инсоляции.

При длительном использовании необходим периодический контроль за функцией почек, печени, органов кроветворения.

Может маскировать проявления сифилиса, в связи с чем, при возможности микст-инфекции, необходимо ежемесячное проведение серологического анализа на протяжении 4 мес.

Прием в период развития зубов может стать причиной необратимого изменения их цвета.

Для профилактики гиповитаминоза следует назначать витамины группы В и К, пивные дрожжи.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Тетрациклин С Нистатином

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: http://drugs.thead.ru/Tetraciklin_S_Nistatinom