Тетрациклин С Нистатином



Код АТХ:

- J01RA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Нистатин
- Тетрациклин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Показания к применению:

Инфекционные заболевания, вызванные чувствительной микрофлорой:

— пневмония;

— бронхит;

— трахеит;

— эмпиема плевры;

— холецистит;

— пиелонефрит;

— кишечные инфекции;

— коклюш;

— эндокардит;

— эндометрит;

— простатит;

— сифилис;

— гонорея;

— бруцеллез;

— риккетсиоз;

— гнойные инфекции мягких тканей;

— остеомиелит;

— трахома;

— конъюнктивит;

— блефарит;

— тонзиллит;

— отит;

— фарингит;

— фурункулез;

— экземы инфицированные;

— сыпь;

— угревая сыпь;

— фолликулит;

— профилактика послеоперационных инфекций.

Относится к болезням:

- Блефарит
- Бронхит
- Гонорея
- Инфекции
- Коклюш
- Конъюнктивит
- Остеомиелит
- Отит
- Пиелит
- Пиелонефрит
- Плеврит
- Пневмония
- Простатит
- Сифилис
- Тонзиллит
- Трахеит
- Трахома
- Фарингит
- Фолликулит
- Фурункул
- Холера
- Холецистит
- Экзема
- Эмпиема
- Эмпиема плевры
- Эндокардит
- Эндометрит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность (III триместр);

— период лактации;

— детский возраст (до 8 лет);

— печеночная недостаточность;

— лейкопения;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы:

Внутрь, запивая большим количеством жидкости, **взрослым** - по 250 мг 4 раза/сут, при необходимости - 2 г/сут.

Детям старше 8 лет - по 25 мг/кг 4 раза/сут.

Побочное действие:

Снижение аппетита, рвота, диарея, тошнота, глоссит, эзофагит, гастрит, изъязвление желудка и двенадцатиперстной кишки, дисфагия; фотосенсибилизация, аллергические реакции (макулопапулезная сыпь, гиперемия кожи, ангионевротический отек, анафилактоидные реакции, лекарственная красная волчанка); гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нейтропения, суперинфекция (включая грибковые); кишечный дисбактериоз; гиповитаминоз В; повышение активности печеночных трансаминаз, гиперкреатининемия, азотемия, гипербилирубинемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность (III триместр); период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В связи с подавлением кишечной микрофлоры снижает протромбиновый индекс (требует коррекции дозы непрямых антикоагулятнов).

Снижает эффективность бактерицидных антибиотиков, нарушающих синтез клеточной стенки (пенициллины, цефалоспорины).

Абсорбцию снижают антациды, содержащие кальций, алюминий и/или магний, препараты железа.

Химотрипсин повышает концентрацию и продолжительность циркуляции.

Особые указания и меры предосторожности:

В связи с возможным развитием фотосенсибилизации необходимо ограничение инсоляции.

При длительном использовании необходим периодический контроль за функцией почек, печени, органов кроветворения.

Может маскировать проявления сифилиса, в связи с чем, при возможности микст-инфекции, необходимо ежемесячное проведение серологического анализа на протяжении 4 мес.

Прием в период развития зубов может стать причиной необратимого изменения их цвета.

Для профилактики гиповитаминоза следует назначать витамины группы В и К, пивные дрожжи.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tetraciklin_S_Nistatinom