Тилорам



Код АТХ:

- J05AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тилорон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** от желтого до оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые; на изломе видны два слоя - пленочная оболочка и ядро оранжевого цвета, допускаются вкрапления белого или оранжевого цвета.

	1 таб.
тилорон (в форме дигидрохлорида)	125 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 101 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 45 мг, кроскармеллоза натрия - 9 мг, вода - 5 мг, повидон К17 - 12 мг, магния стеарат - 3 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 5.7 мг, макрогол 4000 - 1.4 мг, титана диоксид - 2.8 мг, краситель тропеолин О - 0.1 мг.

6 шт. - упаковки контурные ячейковые (1, 2, 3, 4, 5, 10) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1, 2, 3, 4, 5, 10) - пачки картонные.
12 шт. - упаковки контурные ячейковые (1, 2, 3, 4, 5, 10) - пачки картонные.
18 шт. - упаковки контурные ячейковые (1, 2, 3, 4, 5, 10) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки контурные ячейковые (1, 2, 3, 4, 5, 10) - пачки картонные.
24 шт. - упаковки контурные ячейковые (1, 2, 3, 4, 5, 10) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки контурные ячейковые (1, 2, 3, 4, 5, 10) - пачки картонные.
6 шт. - банки (1) - пачки картонные.

10 шт. - банки (1) - пачки картонные.
12 шт. - банки (1) - пачки картонные.
18 шт. - банки (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки (1) - пачки картонные.
24 шт. - банки (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки (1) - пачки картонные.
50 шт. - банки (1) - пачки картонные.
100 шт. - банки (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Низкомолекулярный индуктор эндогенного интерферона. Является синтетическим соединением ароматического ряда, относится к классу флуоренонов. Стимулирует образование в организме интерферонов альфа, бета, гамма. Основными структурами, продуцирующими интерферон в ответ на введение тилорона, являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, гранулоциты. После приема внутрь максимум продукции интерферона определяется в последовательности кишечник-печень-кровь через 4-24 ч. В лейкоцитах человека тилорон индуцирует образование интерферона, уровень которого в крови составляет 250 ЕД/мл.

Оказывает иммуномодулирующее действие: стимулирует стволовые клетки костного мозга, в зависимости от дозы усиливает антителообразование, повышает соотношение высокоавидные/низкоавидные антитела, уменьшает степень иммунодепрессии, восстанавливает соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии: вирусные гепатиты А, В и С; инфекции, вызванные вирусами Herpes simplex типа 1 и 2, Varicella zoster, цитомегаловирусами; инфекционно-аллергические и вирусные энцефаломиелиты (рассеянный склероз, лейкоэнцефалиты, увеоэнцефалиты); урогенитальный и респираторный хламидиоз; негонококковые уретриты; туберкулеза легких.

Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Гепатит
- Гепатоз
- Грипп
- Инфекции
- Лейкоз
- ОРВИ
- Рассеянный склероз
- Склерит
- Туберкулез
- Уретрит
- Энцефалит

Противопоказания:

Беременность, лактация (грудное вскармливание), детский возраст до 7 лет, повышенная чувствительность к тилорону.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь суточная доза составляет 125-250 мг. Частота приема и длительность применения зависят от показаний и схемы лечения.

Побочное действие:

Возможно: кратковременный озноб, аллергические реакции.

В отдельных случаях: диспептические симптомы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Тилорон противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Тилорон совместим с антибиотиками, средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Амебиаз
- Аскаридоз
- Бешенство
- Болезнь Лайма

Источник: http://drugs.thead.ru/Tiloram