

## Тисасен



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Сеннозиды А и В](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Слабительное средство растительного происхождения. В листьях сенны содержатся диантроновые гликозиды (около 3%) - сеннозиды А, А<sub>1</sub>, В-С; небольшое количество антрахиноновых гликозидов, в т.ч. алоэ-эмодин и реин 8-гликозидов; около 10% слизи; флавоноиды, в т.ч. производные камферола; гликозиды нафталена.

Стимулирует перистальтику толстой кишки, вызывает нормальный стул через 8-10 ч после приема. Избирательно действует на ободочную кишку, восстанавливает нормальное функционирование кишечника, не вызывает привыкания и не влияет на пищеварение.

### **Показания к применению:**

Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки. Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах; спастические и атонические запоры различной этиологии.

### **Относится к болезням:**

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Гипотония](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

### **Противопоказания:**

Кишечная непроходимость, боли в животе неясного генеза, нарушения водного и электролитного обмена, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из ЖКТ, маточные кровотечения, цистит, спастический запор.

## **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь вечером после еды. Доза зависит от применяемой лекарственной формы.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* метеоризм, коликообразные боли в животе.

При *длительном применении, особенно в высоких дозах*, - потеря электролитов (в основном калия), альбуминурия и гематурия, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, повреждение межмышечного сплетения.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью применяют при беременности и в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют при заболеваниях печени и/или почек. Можно использовать для предоперационной подготовки пациентов.

### ***При нарушениях функции почек***

С осторожностью применяют при заболеваниях почек.

### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью применяют при заболеваниях печени.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Tisasen>