Тизин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тетризолин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Симпатомиметик. При местном применении вызывает сосудосуживающий эффект, который развивается через несколько минут и сохраняется в течение длительного времени.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению:

Незначительное раздражение глаз; зуд, отек и гиперемия конъюнктивы, жжение, слезотечение, инъецированность склер, обусловленные химическими и физическими факторами (пыль, косметика, плавание в хлорированной воде, действие яркого света); аллергические конъюнктивиты.

Отек слизистой оболочки носовой полости и носоглотки.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Зуд
- Конъюнктивит
- Склерит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тетризолину. Для применения глазных капель: глаукома, эпидермально-эндотелиальная дистрофия роговицы, детский возраст до 3 лет, одновременный прием ингибиторов МАО. Детям в возрасте до 6 лет противопоказано назначение 0.1% капель в нос.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний, применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Со стороны органа зрения: расширение зрачков, повышение внутриглазного давления, реактивная гиперемия.

Со стороны ЦНС: головная боль; при применении капель в нос - сонливость, слабость, тремор, головокружение, нарушение сна.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, нарушения деятельности сердца.

Со стороны эндокринной системы: гипергликемия.

Со стороны дыхательной системы: при применении капель в нос - ощущение жжения и покалывания в носу, чиханье, сухость носовой полости; при длительном применении или превышении дозы - развитие вторичного отека слизистой оболочки носовой полости.

Прочие: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применяют тетризолин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами МАО.

Особые указания и меры предосторожности:

Непрерывное применение глазных капель более 4 дней не рекомендуется. Если в течение 48 ч признаки раздражения глаз сохраняются, следует прекратить применение тетризолина и обратиться к врачу.

С осторожностью применяют тетризолин при артериальной гипертензии, аритмии, аневризме, гипертиреозе, феохромоцитоме, сахарном диабете, тяжелых органических заболеваниях сердца и сосудов (в т.ч. ИБС), в период лечения препаратами, повышающими АД.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (возможность развития нарушения зрения).

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет. Детям в возрасте до 6 лет противопоказано назначение 0.1% капель в нос.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tizin