

Томицид



Код АТХ:

- [D06BX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для местного и наружного применения светло-коричневого цвета, прозрачная, с кисловатым вкусом.

	1 фл.
томицид (стерильный продукт метаболизма непатогенного стрептококка <i>Streptococcus</i> sp. TOM-1606)	90 мл
90 мл - флаконы (1) - пачки картонные.	

Раствор для местного и наружного применения светло-коричневого цвета, прозрачная, с кисловатым вкусом.

	1 фл.
томицид (стерильный продукт метаболизма непатогенного стрептококка <i>Streptococcus</i> sp. TOM-1606)	200 мл
200 мл - флаконы (1) - пачки картонные.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — бактерицидное, антибактериальное, антибактериальное широкого спектра.

Антибактериальное, бактерицидное..

Фармакодинамика

Томицид обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных кокков.

Показания к применению:

— варикозное расширение вен с язвами и без;

- ангина;
- пиодермия;
- открытые раны;
- нагноение ран;
- профилактика нагноений послеоперационных ран;
- другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки;
- декубитальная язва;
- другие язвы нижней конечности.

Допускается применение препарата при ассоциации грамположительных кокков с другими возбудителями.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Варикоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Раны](#)
- [Язва](#)

Противопоказания:

Противопоказаний к применению Томицида не имеется.

Способ применения и дозы:

Препарат применяется наружно.

Лечение ангин

При лечении ангин Томицид применять в виде полосканий. Однократная доза Томицида для полосканий составляет 10-15 мл. Препарат рекомендуется использовать в подогретом виде (от 37 до 42°C)

Контакт с поверхностью слизистой должен быть 3-5 мин. Периодичность полосканий 5-6 раз в сутки. Срок применения - до исчезновения симптомов заболевания.

Лечение пиодермии

Томицид применяется при различных формах пиодермии:

- при поверхностных стрепто-стафилодермиях;
- при глубоких формах пиодермии (фурункулы, карбункулы, гидраденит);
- при вторичных формах пиодермии, осложняющих течение различных дерматозов (экзема, нейродермит);
- при трофических язвах, осложненных вторичной гнойной инфекцией.

Лечение проводится посредством наложения влажной повязки, пропитанной Томицидом, на пораженные очаги 2-3 раза в день, до исчезновения симптомов заболевания.

Лечение гнойных ран

Перед применением Томицида рекомендуется полностью удалить из раны гнойнонекротический субстрат. Затем раневая полость рыхло тампонируется с Томицидом. Перевязки проводятся 1 раз в сутки до появления в ране кровотока сочных грануляций. Последующее лечение проводится Томицидом в сочетании с маслом (вазелиновым или касторовым) в равных соотношениях, до полного заживления раны.

Количество Томицида, используемое на 1 перевязку, зависит от величины и формы гнойной полости и составляет, в среднем, 5-10 мл.

Томицид можно использовать для промывания закрытых гнойных полостей (свищевые ходы, хронический

Томицид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

остеомиелит и др.), локализующихся в соединительной и костной ткани.

Профилактика нагноений послеоперационных ран

Для профилактики нагноений послеоперационных ран Томицид следует применять в виде влажных повязок, накладываемых на раневую поверхность непосредственно после оперативного вмешательства 1 раз в сутки в течение первых 3-5 дней. После этого срока при отсутствии явлений воспаления применение Томицида следует прекратить.

Побочное действие:

При нанесении Томицида на пораженный участок кожи может возникнуть кратковременное жжение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Допускается применение Томицида совместно с другими лекарственными препаратами (антибиотиками, сульфаниламидами).

Особые указания и меры предосторожности:

Не пригоден к применению препарат:

- с истекшим сроком годности;
- с нечеткой маркировкой;
- при нарушении целостности флаконов;
- при помутнении (перед употреблением флакон с Томицидом необходимо встряхнуть и проверить прозрачность жидкости. Помутневший препарат к использованию не пригоден).

Рекламации на качество препарата в течение срока годности направляют в ФГБУ «ГИСК им. Л.А. Тарасевича» Минздравсоцразвития России, (119002, Москва, пер. Сивцев-Вражек, д. 41) и в адрес предприятия-производителя.

Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 10°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Томицид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tomicid>