

## Тонгинал



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли гомеопатические** прозрачные, бесцветные, со слабым запахом камфоры.

	<b>100 мл</b>
камфора (Camphora) D2	2 мл
табакум (Tabacum) D6	10 мл
вератрум (Veratrum) D6	10 мл
глоноинум (Glonoinum) D12	10 мл
ацидум гидроцианикум (Acidum hydrocyanicum) D12	10 мл

*Вспомогательные вещества:* этанол 43% по весу.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.  
50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.  
50 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.  
20 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комплексный гомеопатический препарат.

### Показания к применению:

— в комплексной терапии нейроциркуляторных нарушений (вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу, пароксизмальные состояния, диэнцефальный синдром).

### Относится к болезням:

- [Вегето-сосудистая дистония](#)
- [Гипотония](#)
- [Пароксизм](#)

### Противопоказания:

— детский возраст до 7 лет (из-за недостаточности клинических данных).

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Возраст	Доза (разовая)	Способ применения
Дети от 7 до 12 лет	5 капель	3 раза/сут внутрь, в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды, за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием
Взрослые и дети с 12 лет	10 капель	3 раза/сут внутрь, в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды, за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием

В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата каждые 30 мин-1 ч: **детям от 7 до 12 лет** - по 3-5 капель, **взрослым и детям с 12 лет** - по 8-10 капель, до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза/сут.

## Побочное действие:

*Редко* может возникнуть повышенное слюноотделение. При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и лактации препарат применяется по назначению врача.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Т.к. препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Поскольку препарат Тонгинал содержит около 0.40 г/мл спирта, препарат не должен применяться пациентами с алкогольной зависимостью.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям в возрасте до 7 лет (из-за недостаточности клинических данных).

## Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте. Хранить в местах недоступных для детей.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Tonginal>