Тонгинал



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли гомеопатические*** прозрачные, бесцветные, со слабым запахом камфоры.

	100 мл
камфора (Camphora) D2	2 мл
табакум (Tabacum) D6	10 мл
вератрум (Veratrum) D6	10 мл
глоноинум (Glonoinum) D12	10 мл
ацидум гидроцианикум (Acidum hydrocyanicum) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
20 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат.

Показания к применению:

— в комплексной терапии нейроциркуляторных нарушений (вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу, пароксизмальные состояния, диэнцефальный синдром).

Относится к болезням:

- Вегето-сосудистая дистония
- Гипотония
- Пароксизм

Противопоказания:

— детский возраст до 7 лет (из-за недостаточности клинических данных).

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Возраст	Доза (разовая)	Способ применения
Дети от 7 до 12 лет	5 капель	3 раза/сут внутрь, в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды, за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием
Взрослые и дети с 12 лет	10 капель	3 раза/сут внутрь, в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды, за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием

В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата каждые 30 мин-1 ч: **детям от 7 до 12 лет** - по 3-5 капель, **взрослым** и **детям с 12 лет** - по 8-10 капель, до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко может возникнуть повышенное слюноотделение. При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и лактации препарат применяется по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Т.к. препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Поскольку препарат Тонгинал содержится около 0.40 г/мл спирта, препарат не должен применяться пациентами с алкогольной зависимостью.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 7 лет (из-за недостаточности клинических данных).

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте. Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tonginal