Тонзилгон Н



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Драже*** светло-голубого цвета, гладкие, круглые, двояковыпуклые.

	1 драже
порошок корня алтея (Altheae officinalis, Malvaceae)	8 мг
порошок цветков ромашки (Chamomilla recutita, Asteraceae)	6 мг
порошок травы хвоща (Equisetum arvense, Equisetaceae)	10 мг
порошок листьев ореха грецкого (Juglandis regia, Juglandeae)	12 мг
порошок травы тысячелистника (Achillea millefolium, Asteraceae)	4 мг
порошок коры дуба (Quercus robur, Fagaceae)	4 мг
порошок травы одуванчика (Taraxacum officinale, Asteraceae)	4 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал кукурузный, крахмал картофельный, стеариновая кислота, декстрозы моногидрат, кремния диоксид высокодисперсный, кальция карбонат, декстрозы сироп, индиготин, крахмал кукурузный модифицированный, монтан гликоль воск, поли (1-винил-2-пирролидон) К25, поли (1-винил-2-пирролидон) К30, касторовое масло, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид.

25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде прозрачной или слегка мутной жидкости желто-коричневого цвета, с характерным запахом ромашки; возможно выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

	100 г
водно-спиртовой экстракт*	29 г
* для приготовления 100 мл водно-спиртового экстракта используются	
корни алтея (Altheae officinalis, Malvaceae)	400 мг
цветки ромашки (Chamomilla recutita, Asteraceae)	300 мг
трава хвоща (Equisetum arvense, Equisetaceae)	500 мг
листья ореха грецкого (Juglandis regia, Juglandeae)	400 мг
трава тысячелистника (Achillea millefolium, Asteraceae)	400 мг

кора дуба (Quercus robur, Fagaceae)	200 мг
трава одуванчика (Taraxacum officinale, Asteraceae)	400 мг

Вспомогательные вещества: этанол 16.0-19.5 об.%, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла с дозирующим капельным устройством (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Фармакологические свойства обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Оказывает противовоспалительное и противомикробное действие. Активные компоненты входящих в состав препарата ромашки, алтея и хвоща способствуют повышению активности неспецифических факторов защиты организма. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды ромашки, алтея, тысячелистника и танины дуба оказывают противовоспалительное действие и уменьшают отек слизистой оболочки дыхательных путей.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Тонзилгон Н не предоставлены.

Показания к применению:

— острые и хронические заболевания верхних отделов дыхательных путей (тонзиллиты, фарингиты, ларингиты);

— профилактика осложнений при респираторных вирусных инфекциях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Ларингит
- Тонзиллит
- Фарингит

Противопоказания:

— алкоголизм (для капель для приема внутрь);

— детский возраст до 6 лет (для драже);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности, к растениям семейства сложноцветных).

Препарат в форме капель для приема внутрь не рекомендуется назначать после успешного лечения хронического алкоголизма.

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени (применение возможно только после консультации с врачом).

Способ применения и дозы:

Взрослым при *острых заболеваниях* назначают по 2 драже или по 25 капель; **детям школьного возраста** - по1 драже или 15 капель; **детям дошкольного возраста** - по 10 капель; **грудным детям** - по 5 капель. Кратность приема - 5-6 раз/сут.

После *исчезновения острых симптомов заболевания* **взрослым** назначают по 2 драже или 25 капель, **детям школьного возраста** - по 1 драже или 15 капель, **детям дошкольного возраста** - по 10 капель, **грудным детям** - по 5 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Продолжительность лечения - 1 неделя.

Драже следует принимать не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Капли принимают в неразбавленном виде, некоторое время подержав во рту, прежде чем проглотить.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

При использовании препарата в соответствии с рекомендуемым режимом дозирования случаи передозировки не известны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Тонзилгона Н при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие препарата Тонзилгон Н с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Комбинация Тонзилгона Н с антибактериальными средствами возможна и целесообразна.

При использовании капель для приема внутрь флакон следует держать в вертикальном положении.

При хранении капель для приема внутрь возможно легкое помутнение и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет на активность препарата.

Перед употреблениемсодержимое флакона следует взбалтывать.

Следует учитывать, что 1 драже содержит менее 0.03 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не снижает способность к управлению транспортом и работе с машинами.

При нарушениях функции печени

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени (применение возможно только после консультации с врачом).

Применение в детском возрасте

Противопоказан **детям до 6 лет**(драже).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности драже - 3 года. Срок годности капель для приема внутрь - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tonzilgon_N