

Тонзилгон Н



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Драже** светло-голубого цвета, гладкие, круглые, двояковыпуклые.

	1 драже
порошок корня алтея (<i>Altheae officinalis</i> , Malvaceae)	8 мг
порошок цветков ромашки (<i>Chamomilla recutita</i> , Asteraceae)	6 мг
порошок травы хвоща (<i>Equisetum arvense</i> , Equisetaceae)	10 мг
порошок листьев ореха грецкого (<i>Juglandis regia</i> , Juglandaceae)	12 мг
порошок травы тысячелистника (<i>Achillea millefolium</i> , Asteraceae)	4 мг
порошок коры дуба (<i>Quercus robur</i> , Fagaceae)	4 мг
порошок травы одуванчика (<i>Taraxacum officinale</i> , Asteraceae)	4 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал кукурузный, крахмал картофельный, стеариновая кислота, декстрозы моногидрат, кремния диоксид высокодисперсный, кальция карбонат, декстрозы сироп, индигодин, крахмал кукурузный модифицированный, монтан гликоль воск, поли (1-винил-2-пирролидон) K25, поли (1-винил-2-пирролидон) K30, касторовое масло, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид.

25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

◇ **Капли для приема внутрь** в виде прозрачной или слегка мутной жидкости желто-коричневого цвета, с характерным запахом ромашки; возможно выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

	100 г
водно-спиртовой экстракт*	29 г
* для приготовления 100 мл водно-спиртового экстракта используются	
корни алтея (<i>Altheae officinalis</i> , Malvaceae)	400 мг
цветки ромашки (<i>Chamomilla recutita</i> , Asteraceae)	300 мг
трава хвоща (<i>Equisetum arvense</i> , Equisetaceae)	500 мг
листья ореха грецкого (<i>Juglandis regia</i> , Juglandaceae)	400 мг
трава тысячелистника (<i>Achillea millefolium</i> , Asteraceae)	400 мг

Тонзилгон Н

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

кора дуба (<i>Quercus robur</i> , Fagaceae)	200 мг
трава одуванчика (<i>Taraxacum officinale</i> , Asteraceae)	400 мг

Вспомогательные вещества: этанол 16.0-19.5 об.%, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла с дозирующим капельным устройством (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Фармакологические свойства обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Оказывает противовоспалительное и противомикробное действие. Активные компоненты входящих в состав препарата ромашки, алтея и хвоща способствуют повышению активности неспецифических факторов защиты организма. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды ромашки, алтея, тысячелистника и танины дуба оказывают противовоспалительное действие и уменьшают отек слизистой оболочки дыхательных путей.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Тонзилгон Н не предоставлены.

Показания к применению:

- острые и хронические заболевания верхних отделов дыхательных путей (тонзиллиты, фарингиты, ларингиты);
- профилактика осложнений при респираторных вирусных инфекциях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Ларингит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- алкоголизм (для капель для приема внутрь);
- детский возраст до 6 лет (для драже);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности, к растениям семейства сложноцветных).

Препарат в форме капель для приема внутрь не рекомендуется назначать после успешного лечения хронического алкоголизма.

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени (применение возможно только после консультации с врачом).

Способ применения и дозы:

Взрослым при *острых заболеваниях* назначают по 2 драже или по 25 капель; **детям школьного возраста** - по 1 драже или 15 капель; **детям дошкольного возраста** - по 10 капель; **грудным детям** - по 5 капель. Кратность приема - 5-6 раз/сут.

После *исчезновения острых симптомов заболевания* **взрослым** назначают по 2 драже или 25 капель, **детям школьного возраста** - по 1 драже или 15 капель, **детям дошкольного возраста** - по 10 капель, **грудным детям** - по 5 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Продолжительность лечения - 1 неделя.

Драже следует принимать не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Капли принимают в неразбавленном виде, некоторое время подержав во рту, прежде чем проглотить.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

При использовании препарата в соответствии с рекомендуемым режимом дозирования случаи передозировки не известны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Тонзилгона Н при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие препарата Тонзилгон Н с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Комбинация Тонзилгона Н с антибактериальными средствами возможна и целесообразна.

При использовании капель для приема внутрь флакон следует держать в вертикальном положении.

При хранении капель для приема внутрь возможно легкое помутнение и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет на активность препарата.

Перед употреблением содержимое флакона следует взбалтывать.

Следует учитывать, что 1 драже содержит менее 0.03 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не снижает способность к управлению транспортом и работе с машинами.

При нарушениях функции печени

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени (применение возможно только после консультации с врачом).

Применение в детском возрасте

Противопоказан **детям до 6 лет** (драже).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности драже - 3 года. Срок годности капель для приема внутрь - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tonzilgon_N