Тонзилла композитум



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения и приема внутрь гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Tonsilla suis (тонзилла суис) D28	22 мкл
Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6	22 мкл
Nodus lymphaticus suis (нодус лимфатикус суис) D8	22 мкл
Medulla ossis suis (медулла оссис суис) D10	22 мкл
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10	22 мкл
Splen suis (сплен суис) D10	22 мкл
Hypothalamus suis (гипоталямус суис) D10	22 мкл
Hepar suis (гепар суис) D10	22 мкл
Embryo suis (эмбрио суис) D13	22 мкл
Cortex glandulae suprarenalis suis (кортекс гляндуле супрареналис суис) D13	22 мкл
Pyrogenium-Nosode (пирогениум-нозоде) D198	22 мкл
Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D13	22 мкл
Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D6	22 мкл
Acidum sarcolacticum (ацидум сарколяктикум) D6	22 мкл
Echinacea (эхинацея) D4	22 мкл
Calcium phosphoricum (кальциум фосфорикум) D10	22 мкл
Aesculus hippocastanum (эскулюс хиппокаштанум) D6	22 мкл
Kalium stibyltartaricum (калиум стибилтартарикум) D6	22 мкл
Solanum dulcamara (солянум дулькамара) D4	22 мкл
Levothyroxinum (левотироксинум) D13	22 мкл
Coccus cacti (коккус какти) D6	22 мкл
Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум) D10	22 мкл
Gentiana lutea (гентиана лютеа) D6	22 мкл
Geranium robertianum (гераниум робертианум) D6	22 мкл
Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D13	22 мкл
Barium carbonicum (бариум карбоникум) D28	22 мкл
Conium maculatum (кониум макулятум) D4	22 мкл
Galium aparine (галиум апарине) D6	22 мкл
Sulfur (сульфур) D8	22 мкл
Psorinum-Nosode (псориум-нозоде) D28	22 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии хронического тонзиллита.

Относится к болезням:

- Тонзиллит

Противопоказания:

— системные заболевания (туберкулез, лейкоз, коллагенозы, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания, синдром приобретенного иммунодефицита, вирус иммунодефицита человека и другие хронические вирусные заболевания), в связи с недостаточностью клинических наблюдений;

— возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— известная повышенная чувствительность к Echinacea (эхинацея) или иным растениям семейства сложноцветных;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Пели не прописано иначе, 1 раз в неделю по 1 ампуле внутрь или внутримышечно. Средний курс терапии 5 недель. Длительность лечения определяется врачом.

Побочное действие:

При применении препарата могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности, иногда повышенное слюноотделение.

При появлении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопапшеских лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратим, применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, трсбуюших особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tonzilla_kompozitum