

Тонзилотрен



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки** белые, матовые, двухплоскостные, со скошенной кромкой, без особого запаха или с легким сернистым запахом.

	1 таб.
Atropinum sulfuricum D5	12.5 мг
Hepar sulfuris D3	10 мг
Kalium bichromicum D4	50 мг
Silicea D2	5 мг
Mercurius bijodatus D8	25 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат.

20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при остром и хроническом тонзиллите. Препарат оказывает противовоспалительное действие, стимулирует процессы регенерации, способствует уменьшению гипертрофированных миндалин. Стимулирует иммунитет.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Тонзилотрен не изучена.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии при:

- ангине (катаральная, лакунарная, фолликулярная);
- хроническом тонзиллите;
- для ускорения заживления слизистой оболочки глотки после удаления миндалин.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Удаление миндалин](#)
- [Фолликулит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к хрому или другим компонентам препарата.

Не рекомендуется назначать препарат детям до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

С осторожностью следует назначать препарат при гипертиреозе.

Способ применения и дозы:

При остром течении заболевания **детям от 3 до 12 лет** назначают по 1 таб. каждые 2 ч в течение 1-2 дней (не более 8 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час в течение 1-2 дней (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

При хроническом тонзиллите **детям от 3 до 12 лет** назначают по 1 таб. 3 раза/сут, **взрослым и детям старше 12 лет** - по 1-2 таб. 3 раза/сут в течение 6-8 недель. Рекомендуется проводить повторные курсы лечения (несколько раз в год).

Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая их во рту. Детям от 3 до 5 лет таблетки дают в измельченном виде под язык или растворяют в небольшом количестве жидкости.

Побочное действие:

Возможно: повышенное слюноотделение (в этом случае следует уменьшить дозу или прекратить прием препарата).

Аллергические реакции: в единичных случаях - кожная сыпь, кожный зуд (в этом случае прием препарата следует прекратить).

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тонзилотрен не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Тонзилотрен при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Тонзилотрен с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Тонзилотрена возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Тонзилотрена допускается использование других лекарственных препаратов.

Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия терапевтического эффекта при остром заболевании в

Тонзилотрен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

течение первых 2 дней следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется назначать препарат детям до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tonzilotren>