Тонзипрет (таблетки)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки гомеопатические для рассасывания***, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, белого цвета с желтоватым оттенком.

	1 таб.
Phytolacca americana∅	50 мг
Capsicum D3	75 мг
Guaiacum D3	75 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (100 мг/1 таб.), магния стеарат, крахмал картофельный.

25 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Представляет собой комбинацию экстрактов из трех лекарственных растений — лаконоса американского (Phytolacca), гвайякового дерева (Guaiacum) и перца стручкового (Capsicum), обуславливающих анальгезирующее, противовоспалительное и иммуностимулирующее действие препарата. Отличительной особенностью Тонзипрета является быстро наступающий анальгезирующий эффект, обусловленный действием алкалоида капсаицина, содержащегося в экстракте плодов стручкового перца.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Тонзипрет не предоставлены.

Показания к применению:

— в качестве симптоматического средства при болях в горле при тонзиллите, фарингите и ларингите (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Ларингит
- Тонзиллит
- Фарингит

Противопоказания:

— возраст до 18 лет (из-за недостаточности клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат в связи с содержанием лактозы не следует назначать пациентам с непереносимостью галактозы, генетическим дефицитом лактазы и нарушением всасывания глюкозы/галактозы.

Способ применения и дозы:

При *сильных болях в горле* назначают по 1 таб. через каждые 30-60 мин, но не более 12 раз/сут. При стихании болевого синдрома назначают поддерживающие дозы - по 1 таб. 3 раза/сут за 15 мин до приема пищи. Курс лечения - 7-10 дней.

Таблетки следует медленно рассасывать.

Побочное действие:

Редко: тошнота, расстройства ЖКТ.

При приеме гомеопатического препарата возможно обострение уже существующих симптомов. В этом случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тонзипрет не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Тонзипрет при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) недостаточно изучено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Тонзипрет с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что разовая доза препарата содержит менее 0.03 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не снижает способность к вождению автотранспорта и работе с механизмами.

При нарушениях функции печени

Препарат в форме капель не назначают пациентам с циррозом печени.

Применение в детском возрасте

Недостаточно клинических данных об использовании препарата **детьми до 18 лет.**

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tonzipret_tabletki