

[Торекан \(раствор\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Блокатор гистаминовых H₁-рецепторов. Пиперазиновое производное фенотиазина. Действует на хеморецепторную триггерную зону и непосредственно на центр рвоты. Устраняет головокружения, влияя на координационные центры в ретикулярной формации.

Показания к применению:

Тошнота и рвота различной этиологии (в т.ч. при хирургических вмешательствах и противоопухолевой терапии), головокружение центрального и вестибулярного генеза.

Относится к болезням:

- [Головокружение](#)
- [Рвота](#)

Противопоказания:

Депрессия, коматозные состояния, острый приступ глаукомы, повышенная чувствительность к производным фенотиазина.

Способ применения и дозы:

Внутрь или ректально взрослым и детям старше 15 лет - по 6.5 мг 1-3 раза/сут, в более тяжелых случаях вводят п/к, в/м или в/в по 6.5 мг.

Для профилактики послеоперационной рвоты - в/м 6.5 мг за 30 мин до окончания операции.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту; при длительном применении и повышенной чувствительности

Торекан (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

к тиэтилперазину - нарушение функции печени.

Со стороны ЦНС: головокружение, сонливость; при длительном применении и повышенной чувствительности к тиэтилперазину - экстрапирамидные расстройства.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, тахикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Потенцирует действие этанола, бензодиазепинов, опиоидных анальгетиков и других препаратов, угнетающих функции ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять при тяжелой недостаточности печени и почек.

Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 15 лет.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При необходимости применения у пациентов, деятельность которых требует высокой концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, следует иметь в виду, что тиэтилперазин оказывает выраженное влияние на психофизическое состояние больного, его реакционную способность.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применять при тяжелой недостаточности почек.

При нарушениях функции печени

С осторожностью применять при тяжелой недостаточности печени.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 15 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Torekan_rastvor