Траумель С (капли)

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли гомеопатические для приема внутрь*** бесцветные или светло-желтого цвета, прозрачные, с запахом этанола.

	100 г
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D2	5 г
Calendula officinalis (Calendula) (календула оффициналис (календула)) D2	5 г
Hamamelis virginiana (Hamamelis) (гамамелис виргиниана (гамамелис)) D2	5 г
Achillea millefolium (Millefolium) (ахиллея миллефолиум (миллефолиум)) D3	5 г
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D4	25 г
Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D3	10 г
Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D8	10 г
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D8	10 г
Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D3	8 г
Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D8	8 г
Bellis perennis (беллис переннис) D2	2 г
Echinacea (эхинацея) D2	2 г
Echinacea purpurea (эхинацея пурпурея) D2	2 г
Hypericum perforatum (Hypericum) (гиперикум перфоратум (гиперикум)) D2	1 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

В комплексной терапии:

— воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (в том числе тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит);

— посттравматических состояний (вывих, растяжение связок, сухожилий и мышц, отек мягких тканей после операции, вывихов, растяжений).

Относится к болезням:

- Бурсит
- Вывих
- Вывихи
- Растяжение
- Тендовагинит
- Эпикондилит

Противопоказания:

— туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, синдром приобретенного иммунного дефицита, вирус иммунодефицита человека и другие аутоиммунные заболевания;

— возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— известная повышенная чувствительность к тысячелистнику обыкновенному, ромашке аптечной, ноготкам лекарственным, маргаритке многолетней, эхинацее, арнике горной или иным растениям семейства сложноцветных;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

По 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей - по 30 капель 3 раза в день. Капли принимать за 15 минут до еды, развести в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать во рту 1-2 минуты.

Курс лечения: при посттравматических состояниях - 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях - не менее 3-4 недель.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно повышенное слюноотделение после приема препарата. При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение мази Траумель С.

Максимальная разовая доза препарата (30 капель) содержит около 0.49 г абсолютного спирта этилового (этанола), максимальная суточная доза препарата (90 капель) - около 1.47 г абсолютного спирта этилового (этанола).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на-выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Беречь от перегрева!

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

При нарушениях функции печени

С осторожностью при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Traumel_S_kapli