Траумель С (мазь)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения гомеопатическая*** от белого до желтовато- или розовато-белого цвета, со слабым характерным запахом; не должно ощущаться прогорклого запаха.

	100 г
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D3	1.5 г
Calendula officinalis (Calendula) (календула оффициналис (календула)) ∅	450 мг
Hamamelis virginiana (Hamamelis) (гамамелис виргиниана (гамамелис)) ∅	450 мг
Echinacea (эхинацея) ∅	150 мг
Echinacea purpurea (эхинацея пурпурея) ∅	150 мг
Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) ∅	150 мг
Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D4	100 мг
Bellis perennis (беллис перенис) ∅	100 мг
Hypericum perforatum (Hypericum) (гиперикум перфоратум (гиперикум)) D6	90 мг
Achillea millefolium (Millefolium) (ахиллея миллефолиум (миллефолиум)) ∅	90 мг
Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D1	50 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D1	50 мг
Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D6	40 мг
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D6	25 мг

Вспомогательные вещества: основа гидрофильная (эмульгирующий цетилстеариловый спирт, парафин жидкий, вазелин белый, вода, этанол 96 об.%), стабилизированная этанолом 13.8 об.%.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

В комплексной терапии:

— воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и другие);

— посттравматических состояний (отек мягких тканей после операции, вывихов, растяжений).

Относится к болезням:

- Бурсит
- Вывих
- Вывихи
- Растяжение
- Тендовагинит
- Эпикондилит

Противопоказания:

— туберкулез;

— лейкозы;

— коллагенозы;

— рассеянный склероз;

— синдром приобретенного иммунодефицита (в т.ч. ВИЧ);

— аутоиммунные заболевания;

— детский возраст до 3 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— известная повышенная чувствительность к тысячелистнику обыкновенному, ромашке аптечной, ноготкам лекарственным, маргаритке многолетней, эхинацее, арнике горной или иным растениям семейства сложноцветных;

— повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Детям от 3 лет и взрослым достаточное количество мази наносят тонким слоем на кожу болезненных областей тела и втирают легкими движениями 2-3 раза/сут. Возможно наложение мазевой повязки. Курс лечения при *посттравматических состояниях* - 2 недели и более; при *воспалительных заболеваниях* - не менее 3-4 недель.

Побочное действие:

При применении мази в отдельных случаях могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При обнаружении побочных эффектов, в т.ч. не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает применение других лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Для повышения эффективности лечения рекомендуется прием различных лекарственных форм Траумель С, например, мази, капель или таблеток и раствора для внутримышечного и околосуставного введения.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При нарушении кожных покровов и кожных заболеваниях, мазь следует применять после консультации с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Не применять по истечении срока годности. Беречь от перегрева!

Тубу следует закрывать сразу после применения препарата.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Traumel_S_maz