

## Траумель С (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

## Траумель С (мазь)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения гомеопатическая** от белого до желтовато- или розовато-белого цвета, со слабым характерным запахом; не должно ощущаться прогорклого запаха.

	<b>100 г</b>
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D3	1.5 г
Calendula officinalis (Calendula) (календула официналис (календула)) Ø	450 мг
Hamamelis virginiana (Hamamelis) (гамамелис виргиниана (гамамелис)) Ø	450 мг
Echinacea (эхинацея) Ø	150 мг
Echinacea purpurea (эхинацея пурпурея) Ø	150 мг
Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) Ø	150 мг
Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум официнале (симфитум)) D4	100 мг
Bellis perennis (беллис переннис) Ø	100 мг
Hypericum perforatum (Hypericum) (гиперикум перфоратум (гиперикум)) D6	90 мг
Achillea millefolium (Millefolium) (ахиллея миллефолиум (миллефолиум)) Ø	90 мг
Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D1	50 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D1	50 мг
Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D6	40 мг
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D6	25 мг

**Вспомогательные вещества:** основа гидрофильная (эмульгирующий цетилстеариловый спирт, парафин жидкий, вазелин белый, вода, этанол 96 об.%), стабилизированная этанолом 13.8 об.%.

## Траумель С (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

## Показания к применению:

В комплексной терапии:

- воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и другие);
- посттравматических состояний (отек мягких тканей после операции, вывихов, растяжений).

## Относится к болезням:

- [Бурсит](#)
- [Вывих](#)
- [Вывихи](#)
- [Растяжение](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Эпикондилит](#)

## Противопоказания:

- туберкулез;
- лейкозы;
- коллагенозы;
- рассеянный склероз;
- синдром приобретенного иммунодефицита (в т.ч. ВИЧ);
- аутоиммунные заболевания;
- детский возраст до 3 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- известная повышенная чувствительность к тысячелистнику обыкновенному, ромашке аптечной, ноготкам лекарственным, маргаритке многолетней, эхинацее, арнике горной или иным растениям семейства сложноцветных;
- повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Детям от 3 лет и взрослым** достаточное количество мази наносят тонким слоем на кожу болезненных областей тела и втирают легкими движениями 2-3 раза/сут. Возможно наложение мазевой повязки. Курс лечения при *посттравматических состояниях* - 2 недели и более; при *воспалительных заболеваниях* - не менее 3-4 недель.

## Побочное действие:

При применении мази в отдельных случаях могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При обнаружении побочных эффектов, в т.ч. не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение гомеопатических препаратов не исключает применение других лекарственных средств.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Для повышения эффективности лечения рекомендуется прием различных лекарственных форм Траумель С, например, мази, каплей или таблеток и раствора для внутримышечного и околосуставного введения.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При нарушении кожных покровов и кожных заболеваниях, мазь следует применять после консультации с врачом.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Не применять по истечении срока годности. Беречь от перегрева!

Тубу следует закрывать сразу после применения препарата.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Traumel\\_S\\_maz](http://drugs.thead.ru/Traumel_S_maz)