

Траумель С (раствор)**Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м и околосуставного введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D2	2.2 мкл
Calendula officinalis (Calendula) (календула официналис (календула)) D2	2.2 мкл
Hamamelis virginiana (Hamamelis) (гамамелис виргиниана (гамамелис)) D1	0.22 мкл
Achillea millefolium (Millefolium) (ахиллея миллефолиум (миллефолиум)) D3	2.2 мкл
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D2	2.2 мкл
Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D2	1.32 мкл
Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солубилис Ганемани) D6	1.1 мкл
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D6	2.2 мкл
Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D3	2.2 мкл
Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум официнале (симфитум)) D6	2.2 мкл
Bellis perennis (беллис переннис) D2	1.1 мкл
Echinacea (эхинацея) D2	0.55 мкл
Echinacea purpurea (эхинацея пурпуря) D2	0.55 мкл
Hypericum perforatum (Hypericum) (гиперикум перфоратум (гиперикум)) D2	0.66 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
 2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в комплексной терапии при вывихах, растяжениях, переломах костей, отеках мягких тканей после операции и травм, воспалительных процессах различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит), артрозах.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Бурсит](#)
- [Вывих](#)
- [Вывихи](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Травмы](#)
- [Эпикондилит](#)

Противопоказания:

— известная повышенная чувствительность к *Achillea millefolium* (тысячелистник обыкновенный), *Chamomilla recutita* (ромашка аптечная), *Calendula officinalis* (ноготки лекарственные), *Bellis perennis* (маргаритка многолетняя), *Echinacea* (эхинацея), *Arnica montana* (Арника горная) или иным растениям семейства сложноцветных;

— туберкулез;

— лейкозы;

— коллагенозы;

— рассеянный склероз;

— синдром приобретенного иммунного дефицита, ВИЧ-инфекция;

— другие аутоиммунные заболевания;

— детский возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают по 1-2 ампуле 1-3 раза в неделю в/м, околосуставно.

Курс лечения - 4-5 недель. Кратность применения и длительность курса назначает врач.

Рекомендуется одновременный прием нескольких лекарственных форм препарата (например, таблетки или капли вместе с мазью и инъекциями).

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Очень редко: появление красноты, припухлости, зуда в месте инъекции.

В редких случаях: повышенное слюноотделение после приема препарата.

При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, а также при появлении побочных эффектов, следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Traumel_S_rastvor