Трависил (мазь)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения*** полупрозрачная, белого или почти белого цвета с характерным запахом левоментола и камфоры.

	5 г
камфора	0.275 г
скипидар живичный	0.2265 г
левоментол	0.15 г
масло эвкалиптовое	0.0575 г
масло мускатное	0.027 г
тимол	0.055 г

Вспомогательные вещества: вазелин 4.0585 г, парафин жидкий 0.1 г, парафин твердый 0.1 г.

25 г - банки пластмассовые (1) - пачки картонные.
50 г - банки пластмассовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает местнораздражающее, отвлекающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком, чувством заложенности носа, головной болью.

Относится к болезням:

- Головная боль
- Насморк
- Острые респираторные заболевания

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— повреждение кожных покровов и/или наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения препарата;

— склонность к бронхоспазму;

— беременность, период грудного вскармливания;

— детский возраст до 2 лет.

Способ применения и дозы:

Только для наружного применения!

— *при насморке или заложенности носа* мазь наносится на кожу крыльев носа;

— *при головной боли* мазь наносят на кожу височной области.

Применять 2 раза/сут, курс - не более 7 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции: покраснение, зуд, раздражение кожи в местах нанесения препарата.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сведений о взаимодействии с другими лекарственными средствами нет.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки полости носа и рта; а также на поврежденные участки кожи.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 2 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей, в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Travisil_maz