

## Травоген



### Код АТХ:

- [D01AC05](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Изоконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Крем для наружного применения 1%** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, непрозрачный, однородный.

	<b>100 г</b>
Изоконазола нитрат	1 г

*Вспомогательные вещества:* полисорбат 60 - 3.5 г, сорбитана стеарат - 1 г, цетилстеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%) - 5 г, парафин жидкий - 10 г, вазелин белый - 10 г, вода очищенная - 69.5 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

## Травоген

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат для наружного применения, синтетическое производное имидазола. Оказывает местное противогрибковое и антибактериальное действие. Действует фунгистатически, при увеличении концентрации фунгицидно. Подавляет синтез эргостерола и изменяет состав мембраны микробной клетки.

Активен в отношении дерматофитов (*Trichophyton* spp., *Microsporum* spp., *Epidermophyton* spp.), плесневых, дрожжевых и дрожжеподобных грибов (*Candida* spp., *Pityrosporum orbiculare*), *Corynebacterium minutissimum* (возбудителя эритразмы) и грамположительных бактерий (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp.).

### Фармакокинетика

При нанесении на кожу системная абсорбция незначительна.

## Показания к применению:

Грибковые поражения кожи, в т.ч. вторично инфицированные:

- микозы стоп и гладкой кожи (в т.ч. с локализацией в складках кожи и в области наружных половых органов);
- микроспория, трихофития, руброфития;
- эпидермофития;
- кандидомикозы;
- разноцветный (отрубевидный) лишай;
- эритразма.

## Относится к болезням:

- [Лишай](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Эпидермофития](#)
- [Эритразма](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям с возраста 1 месяц** Травоген наносят 1 раз/сут тонким слоем на пораженные участки кожи и слегка втирают. Курс лечения обычно составляет 2-3 недели, с локализацией микозов в складках - до 4 недель. Возможно проведение и более длительного курса лечения. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжать в течение 2 недель после разрешения клинических проявлений.

## Побочное действие:

*Дерматологические реакции:* редко - раздражение кожи (ощущение жжения и зуда, эритема); крайне редко - кожные аллергические реакции.

Как правило, Травоген переносится хорошо, даже при нанесении на чувствительную кожу.

## Передозировка:

До настоящего времени сообщений о передозировке препарата не имеется.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

## Травоген

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Применение препарата при беременности возможно в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода.

Не установлено, проникает ли изоконазол в грудное молоко, поэтому препарат не следует наносить на молочные железы перед кормлением. При необходимости применения препарата решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не выявлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат предназначен только для наружного применения.

При появлении симптомов, свидетельствующих о повышенной чувствительности или раздражении, препарат следует отменить.

Следует избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании препарата в глаза следует тщательно промыть их теплой водой.

Пациент должен информировать врача о появлении любых нежелательных эффектах на фоне лечения Травогеном.

При отсутствии эффекта пациенту следует проконсультироваться у врача.

#### *Использование в педиатрии*

Лечение Травогеном **детей с 1 месяца до 2-х лет** проводится под наблюдением врача.

#### **Применение в детском возрасте**

**Лечение Травогеном детей с 1 месяца до 2-х лет** проводится под наблюдением врача.

**Детям с возраста 1 месяц** Травоген наносят 1 раз/сут тонким слоем на пораженные участки кожи и слегка втирают. Курс лечения обычно составляет 2-3 недели, с локализацией микозов в складках - до 4 недель. Возможно проведение и более длительного курса лечения. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжать в течение 2 недель после разрешения клинических проявлений.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C. Срок годности – 5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Travogen>