Травохол



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Эликсир в виде прозрачной жидкости красновато-коричневого цвета, характерного запаха; в процессе хранения.

	1 л
цветки бессмертника песчаного	18 г
цветки пижмы обыкновенной	12 г
листья крапивы двудомной	6 г
листья мяты перечной	9 г
корни солодки голой	3 г
плоды шиповника	12 г
плоды черной смородины	40 г
плоды черемухи обыкновенной	40 г

Вспомогательные вещества: сахар до 30 г, этанол 40% для получения 1 л эликсира.

100 мл - банки (1) - пачки картонные.
250 мл - банки (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
250 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает выраженное желчегонное действие (стимулирует образование и выделение желчи), обладает противовоспалительной, антиоксидантной, спазмолитической, мембранстабилизирующей активностью, а также бактериостатическим действием в отношении Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli; стимулирует детоксикационную функцию печени. Содержащиеся в препарате витамины (аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В) способствуют нормализации обмена веществ.

Показания к применению:

— в качестве желчегонного средства в терапии хронических некалькулезных холециститов, дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу.

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— калькулезный холецистит;

— острые и подострые дистрофии печени;

— острый гепатит;

— обтурационная желтуха;

— беременность;

— период лактации;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* (вследствие содержания этанола в препарате): эпилепсия, травмы и заболевания головного мозга, алкоголизм.

Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым** по 20-40 капель, разведенных в 50-100 мл воды, 3 раза/сут за 30 мин до еды. Курс лечения - 3-4 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит не менее 35% этанола.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при острых и подострых дистрофиях печени, остром гепатите.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Travohol