

## Травокорт



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дифлукортолон](#)
- [Изоконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Крем для наружного применения** белого или слегка желтоватого цвета, непрозрачный, однородный.

	<b>100 г</b>
изоконазола нитрат	1 г
дифлукортолона валерат	100 мг

*Вспомогательные вещества:* полисорбат 60 - 3.5 г, сорбитана стеарат - 1 г, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%) - 5 г, парафин жидкий - 10 г, вазелин белый - 10 г, динатрия эдетат - 100 мг, вода очищенная - 69.3 г.

15 г - тубы алюминиевые ламинированные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения.

*Изоконазол* - синтетическое производное имидазола. Оказывает противогрибковое и антибактериальное действие. Действует фунгицидно и бактерицидно. Подавляет синтез эргостерола мембран клеток гриба, вызывая его гибель, блокирует синтез белков бактерий. *Активен в отношении* дерматофитов (*Trichophyton* spp., *Microsporum* spp., *Epidermophyton* spp.), плесневых, дрожжевых и дрожжеподобных грибов (*Candida* spp., *Pityrosporum orbiculare/ovale*), *Corynebacterium minutissimum* (возбудителя эритразмы), трихомонад и грамположительных бактерий (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp.).

*Дифлукортолона валерат* – ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное, противоаллергическое и противозудное действие.

**Фармакокинетика**

Исследования по фармакокинетике не проводились.

**Показания к применению:**

Дерматозы сочетанной этиологии, чувствительные к терапии ГКС, инфицированные грибковой или бактериальной флорой.

Грибковые поражения кожи, в т.ч. вторично инфицированные, сопровождающиеся выраженными воспалительными или экземоподобными симптомами:

— микозы стоп и гладкой кожи, в т.ч. с локализацией в складках, межпальцевых промежутках, области наружных половых органов (в т.ч. баланопостит): микроспория, трихофития, руброфития, эпидермофития;

— кандидомикозы;

— эритразма.

**Относится к болезням:**

- [Баланит](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Экзема](#)
- [Эпидермофития](#)
- [Эритразма](#)

**Противопоказания:**

— туберкулез кожи;

— кожные проявления сифилиса;

— вирусные поражения кожи (ветряная оспа, опоясывающий лишай);

— кожные поствакцинальные реакции;

— I триместр беременности;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Травокорт наносят тонким слоем на пораженные участки кожи и слегка втирают 2 раза/сут (утром и на ночь). Максимальная длительность лечения составляет 2 недели.

**Побочное действие:**

Обычно Травокорт переносится хорошо, даже при нанесении на чувствительную кожу.

*Редко:* раздражение кожи и аллергические реакции.

Учитывая, что в состав препарата входит ГКС для наружного применения, при применении крема на обширных поверхностях (более 10% поверхности кожи), в течение длительного времени (более 4 недель) и/или при использовании окклюзионной повязки возможно появление побочных эффектов, характерных для ГКС: атрофия кожи, телеангиэктазии, стрии, акнеподобный дерматит, периоральный дерматит, гипертрихоз, а также системные побочные эффекты (подавление функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы).

## **Передозировка:**

Симптомы острой передозировки не описаны, однако при чрезмерном или длительном применении препарата возможна хроническая передозировка, сопровождающаяся описанными побочными реакциями.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью следует назначать препарат во II и III триместрах беременности и в период лактации. Противопоказан в I триместре беременности.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не выявлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат предназначен только для наружного применения.

Следует избегать попадания препарата в глаза и нанесения на открытые раны. При случайном попадании препарата в глаза следует тщательно промыть их теплой водой.

У пациентов с розацеа или периоральным дерматитом следует избегать нанесения препарата на кожу лица.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не выявлено.

### ***Применение в детском возрасте***

Препарат назначают **детям в возрасте 2 лет и старше** только по строгим показаниям и под контролем врача, т.к. возможно развитие системных побочных эффектов, связанных с действием дифлукортолона.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Travokort>