

Трекрезан



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические.

	1 таб.
оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (трекрезан)	200 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, сахар молочный (лактозы моногидрат), кальций стеариновоокислый (кальция стеарат).

50 шт. - банки (1) - пачки картонные.
10 шт. - банки (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Трекрезан – иммуномодулирующий препарат с выраженными адаптогенными свойствами. Препарат стимулирует выработку α - и γ -интерферонов, способствует повышению и коррекции иммунного статуса организма за счет активации клеточного и гуморального иммунитета, стимулирует фагоцитарную активность макрофагов.

Препарат укрепляет иммунную систему организма, повышает выносливость при физических и умственных нагрузках, уменьшает действие различных токсинов, повышает устойчивость организма к гипоксии, низким и высоким температурам и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

Препарат обладает выраженным антитоксическим действием при отравлении этанолом, органическими растворителями, солями тяжелых металлов.

Показания к применению:

Трекрезан применяют:

- для повышения иммунитета (профилактика и лечение простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ и других вирусных и бактериальных заболеваний);
- для повышения физической, умственной работоспособности и профилактики переутомления, повышения сопротивляемости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение);
- при вторичных иммунодефицитных состояниях, в т. ч. на фоне длительной антибиотикотерапии;
- в составе комплексной терапии при отравлении солями тяжелых металлов;
- в составе комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома.

Относится к болезням:

- [Грипп](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- дети до 12 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности применения);
- беременность;
- период лактации;
- наследственная непереносимость лактозы;
- недостаточность лактазы или нарушение всасывания глюкозы и галактозы.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний **взрослым и детям старше 12 лет** – по 0.2 г/сут в течение 7-14 дней.

В период лечения простудного заболевания, гриппа, ОРВИ **взрослым и детям старше 12 лет** – в первый день 0.6 г/сут, далее ежедневно по 0.2 г/сут курсом в течение 7 дней.

Для повышения физической и умственной работоспособности и усиления сопротивляемости организма различным стрессовым воздействиям – в первый день 0.6 г/сут, далее ежедневно по 0.2 г/сут курсом в течение 7 дней.

При отравлении солями тяжелых металлов – по 0.4-0.6 г/сут ежедневно в течение не менее 5 дней.

Для уменьшения проявлений алкогольного абстинентного синдрома – по 0.4-0.6 г/сут ежедневно в течение 5 дней.

При необходимости лечение повторяют с интервалами между курсами 1-2 месяца.

Побочное действие:

В редких случаях аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препаратами не отмечены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не отмечено нежелательного взаимодействия с другими лекарственными препаратами.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Trekrezan>