

Трибестан



Код АТХ:

- [G04BE](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Якорцев стелющихся травы экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
сухой экстракт травы якорцев стелющихся	250 мг,
содержащий фураностаноловые сапонины в пересчете на протодиосцин не менее 112.5 мг	

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (авицель рН 101), кремния диоксид коллоидный, повидон (коллидон К25), кросповидон (полипласдон XL), магния стеарат, тальк.

Состав оболочки: опадрай (Опадры АМВ brown): поливиниловый спирт (частично гидролизированный), тальк, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный, железа оксид желтый, лецитин соевый, камедь ксантановая.

10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Трибестан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Фармакодинамика

Гиполипидемический препарат растительного происхождения. Тормозит всасывание холестерина в кишечнике, уменьшает свертываемость крови, повышает тонус тонкого кишечника и стимулирует его сокращения.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Трибестан не предоставлены.

Показания к применению:

— для снижения общего холестерина в крови с целью профилактики атеросклероза.

Относится к болезням:

- [Холера](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- возраст до 18 лет;
- склонность к кровотечениям;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь по 1-2 таб. 3 раза/сут во время приема пищи. Возможно проведение повторных курсов лечения по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможно: тошнота (проходит при уменьшении дозы или временном /2-3 дня/ прекращении приема препарата), аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Трибестан не отмечены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Трибестан не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Трибестан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Противопоказание: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tribestan>