Триган



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Дицикловерин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

М-холиноблокатор, является четвертичным амином. Обладает антихолинергической активностью. Оказывает спазмолитическое действие, вызывает расслабление гладкой мускулатуры.

Фармакокинетика

После в/м введения время достижения C_{max} составляет 60-90 мин, $T_{1/2}$ - 1.8 ч. Выводится почками - 79.5%.

Показания к применению:

Колика (кишечная, печеночная, почечная); альгодисменорея.

Относится к болезням:

- Альгодисменорея

Противопоказания:

Обструктивные заболевания кишечника, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, рефлюкс-эзофагит; гиповолемический шок; закрытоугольная глаукома; миастения; детский возраст до 6 месяцев; период лактации; повышенная чувствительность к дицикловерину.

Способ применения и дозы:

Вводят в/м, разовая доза - 20 мг. При необходимости повторного введения интервал между инъекциями должен составлять 4-6 ч.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головокружение, сонливость.

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота, запор, потеря вкусовых ощущений, анорексия.

Со стороны органа зрения: паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.

Прочие: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Дицикловерин противопоказан к применению в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с амантадином, антипсихотическими препаратами, бензодиазепинами, ингибиторами МАО, опиоидными анальгетиками, нитратами и нитритами, симпатомиметиками, трициклическими антидепрессантами, м-холиноблокаторами, ГКС действие дицикловерина усиливается.

Дицикловерин усиливает действие сердечных гликозидов.

Особые указания и меры предосторожности:

При высокой температуре окружающей среды повышается вероятность гипертермии и развития теплового удара вследствие снижения потоотделения.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 6 месяцев.

Источник: http://drugs.thead.ru/Trigan