Тримедат Валента



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тримебутин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство, регулирующее перистальтику ЖКТ. Полагают, что эффект тримебутина обусловлен влиянием на опиоидные рецепторы ЖКТ.

Показания к применению:

Для приема внутрь и ректально: симптоматическое лечение болей, связанных с функциональными расстройствами ЖКТ и желчевыводящих путей.

Для парентерального применения: симптоматическое лечение выраженных болевых проявлений при функциональных нарушениях ЖКТ; лечение постоперационного паралитического илеуса и при подготовке к проведению рентгеновского и эндоскопического исследований.

Относится к болезням:

- Паралич

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тримебутину.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный. Суточная доза для приема внутрь - до 300 мг, ректально - 100-200 мг. В/м или в/в разовая доза - 50 мг, частота и длительность применения зависят от клинической ситуации.

У детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

Побочное действие:

Возможно: кожные аллергические реакции; при в/в введении - кратковременные обмороки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания и меры предосторожности:

Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы показаниям к применению.

Применение в детском возрасте

У детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

Источник: http://drugs.thead.ru/Trimedat_Valenta