

## [\*\*Тримедат Валента\*\*](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- Тримебутин

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство, регулирующее перистальтику ЖКТ. Полагают, что эффект тримебутина обусловлен влиянием на опиоидные рецепторы ЖКТ.

### **Показания к применению:**

Для приема внутрь и ректально: симптоматическое лечение болей, связанных с функциональными расстройствами ЖКТ и желчевыводящих путей.

Для парентерального применения: симптоматическое лечение выраженных болевых проявлений при функциональных нарушениях ЖКТ; лечение постоперационного паралитического илеуса и при подготовке к проведению рентгеновского и эндоскопического исследований.

### **Относится к болезням:**

- [Паралич](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к тримебутину.

### **Способ применения и дозы:**

Индивидуальный. Суточная доза для приема внутрь - до 300 мг, ректально - 100-200 мг. В/м или в/в разовая доза - 50 мг, частота и длительность применения зависят от клинической ситуации.

У детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

## **Побочное действие:**

Возможно: кожные аллергические реакции; при в/в введении - кратковременные обмороки.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы показаниям к применению.

### **Применение в детском возрасте**

У детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Trimedat\\_Valenta](http://drugs.thead.ru/Trimedat_Valenta)