Тробицин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Спектиномицин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Порошок для приготовления раствора для инъекций	**1 фл.**
спектиномицина гидрохлорид	2 г

Растворитель: вода д/и - 3.2 мл.

2 г - флаконы (1) в комплекте с растворителем (амп. - 1 шт.) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибиотик трициклической структуры. Нарушает синтез белка в микробной клетке, связываясь с 30S субъединицей бактериальных рибосом.

Активен в отношении грамотрицательных бактерий, среди которых наиболее чувствительны Neisseria gonorrhoeae, в т.ч. штаммы, продуцирующие пенициллиназу. Спектиномицин оказывает бактериостатическое действие, хотя на чувствительных гонококков в концентрациях, несколько больших, чем МПК, может действовать бактерицидно.

Не активен в отношении Treponema pallidum и Chlamydia spp.

Показания к применению:

Острый гонорейный уретрит и простатит у мужчин; острый гонорейный цервицит и проктит у женщин; лечение пациентов, имевших половые контакты с больными гонореей.

Относится к болезням:

- Гонорея
- Проктит
- Простатит
- Уретрит
- Цервицит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к спектиномицину.

Способ применения и дозы:

Вводят в/м (глубоко).

Для взрослых при лечении неосложненной гонореи доза составляет 2 г однократно, в отдельных случаях - 4 г в виде 2 инъекций (в разные места). Для детей доза составляет 40 мг/кг.

При диссеминированной инфекции проводят курсовое лечение, при этом величину вводимой дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально.

Побочное действие:

После однократного введения: тошнота, головная боль, головокружение, бессонница, уменьшение диуреза, лихорадка, озноб, кожные высыпания; редко - анафилактоидные реакции; боли в месте инъекции.

При *курсовом применении в отдельных случаях:* снижение уровня гемоглобина и гематокрита, повышение уровня печеночных трансаминаз, ЩФ, мочевины в крови, снижение КК.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять при гонококковом фарингите.

Спектиномицин эффективен в случае резистентности к другим антибиотикам.

Источник: http://drugs.thead.ru/Trobicin