

## Тробицин



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Спектиномицин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

*Форма выпуска, описание и состав*

<b>Порошок для приготовления раствора для инъекций</b>	<b>1 фл.</b>
спектиномицина гидрохлорид	2 г

*Растворитель:* вода д/и - 3.2 мл.

2 г - флаконы (1) в комплекте с растворителем (амп. - 1 шт.) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антибиотик трициклической структуры. Нарушает синтез белка в микробной клетке, связываясь с 30S субъединицей бактериальных рибосом.

Активен в отношении грамотрицательных бактерий, среди которых наиболее чувствительны *Neisseria gonorrhoeae*, в т.ч. штаммы, продуцирующие пенициллиназу. Спектиномицин оказывает бактериостатическое действие, хотя на чувствительных гонококков в концентрациях, несколько больших, чем МПК, может действовать бактерицидно.

Не активен в отношении *Treponema pallidum* и *Chlamydia spp.*

### **Показания к применению:**

Острый гонорейный уретрит и простатит у мужчин; острый гонорейный цервицит и проктит у женщин; лечение пациентов, имевших половые контакты с больными гонореей.

### Относится к болезням:

- [Гонорея](#)
- [Проктит](#)
- [Простатит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цервицит](#)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к спектиномицину.

### Способ применения и дозы:

Вводят в/м (глубоко).

Для взрослых при лечении неосложненной гонореи доза составляет 2 г однократно, в отдельных случаях - 4 г в виде 2 инъекций (в разные места). Для детей доза составляет 40 мг/кг.

При диссеминированной инфекции проводят курсовое лечение, при этом величину вводимой дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально.

### Побочное действие:

*После однократного введения:* тошнота, головная боль, головокружение, бессонница, уменьшение диуреза, лихорадка, озноб, кожные высыпания; редко - анафилактические реакции; боли в месте инъекции.

*При курсовом применении в отдельных случаях:* снижение уровня гемоглобина и гематокрита, повышение уровня печеночных трансаминаз, ЩФ, мочевины в крови, снижение КК.

### Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять при гонококковом фарингите.

Спектиномицин эффективен в случае резистентности к другим антибиотикам.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Trobicin>