Троксерутин Врамед



Код АТХ:

- C05CA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Троксерутин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы***	**1 капс.**
троксерутин	300 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Флавоноид (производное рутина), обладает Р-витаминной активностью; оказывает венотонизирующее, ангиопротекторное, противовоспалительное и противоотечное действие; уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.

Его фармакодинамические свойства связаны с участием биофлавоноидов троксерутина в окислительно-восстановительных процессах и ингибирования гиалуронидазы. Подавляя гиалуронидазу, троксерутин стабилизирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек и уменьшает их проницаемость. Обладает антиоксидантной активностью, в результате чего предотвращает окисление аскорбиновой кислоты, адреналина и липидов. Кроме того, уменьшает пермеабилитет и ломкость капилляров, предотвращает повреждение базальной мембраны эндотельных клеток при воздействии на нее различных факторов. Троксерутин снижает экссудативное воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности. В результате лечения троксерутином исчезает чувство тяжести в ногах, уменьшается отечность тканей, улучшается трофика.

Фармакокинетика

Хорошо всасывается при применении внутрь. Максимальные плазменные концентрации устанавливаются между вторым и восьмым часом. Второй максимум плазменной концентрации наблюдают на 30-м часу после приема

препарата.

Выводится в течение 24 ч в основном с желчью (до 70%), а незначительная часть (до 25%) - с мочой.

Показания к применению:

— хроническая венозная недостаточность;

— варикозное расширение вен, варикозный дерматит, варикозные язвы;

— тромбофлебит и посттромботический синдром;

— геморрой (для облегчения симптомов);

— посттравматический отек мягких тканей;

— в комплексном лечении диабетической ретинопатии.

Относится к болезням:

- Варикоз
- Варикозные язвы
- Венозная недостаточность
- Геморрой
- Дерматит
- Диабетическая ретинопатия
- Ретинопатия
- Тромбоз
- Тромбофлебит

Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и хронический гастрит в фазе обострения;

— беременность (I триместр);

— непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или глюкозо-галактозный синдром мальабсорбции;

— сверхчувствительность к троксерутину или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.

С *осторожностью:* почечная недостаточность (при длительном применении).

Способ применения и дозы:

Капсулы принимают внутрь во время еды.

Начальная доза для **взрослых** по 1 капс. 2-3 раза/сут до полного исчезновения симптомов. Для поддерживающего лечения рекомендована доза по 1 капс./сут в течение 3-4 недель.

Опыт применения препарата у детей ограничен, поэтому не рекомендуется назначать его детям.

Побочное действие:

Редко наблюдаются побочные эффекты:

Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боль в желудке, метеоризм, диарея и эрозивно-язвенные поражения ЖКТ.

Со стороны кожных покровов: эритема и зуд.

Общие нарушения: головная боль.

Передозировка:

Нет данных о передозировке препарата при его применении внутрь.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В первые 3 месяца беременности не рекомендуется использование лекарственного препарата троксерутин.

В течение II и III триместра беременности и при грудном вскармливании назначение препарата требует учитывать соотношение предполагаемой пользы для матери и потенциального риска для ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных о неблагоприятном взаимодействии троксерутина с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Троксерутин неэффективен при отеках, вызванных сопутствующими заболеваниями печени, почек и сердца.

Краситель Е 110 может вызвать аллергические реакции.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность водить транспортные средства и работать с машинами.

При нарушениях функции почек

С осторожностью следует применять препарат при почечной недостаточности длительно.

Применение в детском возрасте

Опыт применения препарата у детей ограничен, поэтому не рекомендуется назначать его детям.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Trokserutin_Vramed