

## [Троксерутин Врамед](#)



### Код АТХ:

- [C05CA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Троксерутин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

↕ <b>Капсулы</b>	<b>1 капс.</b>
Троксерутин	300 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Флавоноид (производное рутина), обладает Р-витаминной активностью; оказывает веноотонизирующее, ангиопротекторное, противовоспалительное и противоотечное действие; уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.

Его фармакодинамические свойства связаны с участием биофлавоноидов троксерутина в окислительно-восстановительных процессах и ингибирования гиалуронидазы. Подавляя гиалуронидазу, троксерутин стабилизирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек и уменьшает их проницаемость. Обладает антиоксидантной активностью, в результате чего предотвращает окисление аскорбиновой кислоты, адреналина и липидов. Кроме того, уменьшает пермеабилитет и ломкость капилляров, предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток при воздействии на нее различных факторов. Троксерутин снижает экссудативное воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности. В результате лечения троксерутином исчезает чувство тяжести в ногах, уменьшается отечность тканей, улучшается трофика.

#### **Фармакокинетика**

Хорошо всасывается при применении внутрь. Максимальные плазменные концентрации устанавливаются между вторым и восьмым часом. Второй максимум плазменной концентрации наблюдают на 30-м часу после приема

препарата.

Выводится в течение 24 ч в основном с желчью (до 70%), а незначительная часть (до 25%) - с мочой.

### Показания к применению:

- хроническая венозная недостаточность;
- варикозное расширение вен, варикозный дерматит, варикозные язвы;
- тромбоз и посттромботический синдром;
- геморрой (для облегчения симптомов);
- посттравматический отек мягких тканей;
- в комплексном лечении диабетической ретинопатии.

### Относится к болезням:

- [Варикоз](#)
- [Варикозные язвы](#)
- [Венозная недостаточность](#)
- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Диабетическая ретинопатия](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)

### Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и хронический гастрит в фазе обострения;
  - беременность (I триместр);
  - непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или глюкозо-галактозный синдром мальабсорбции;
  - сверхчувствительность к троксерутину или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.
- С осторожностью: почечная недостаточность (при длительном применении).

### Способ применения и дозы:

Капсулы принимают внутрь во время еды.

Начальная доза для **взрослых** по 1 капс. 2-3 раза/сут до полного исчезновения симптомов. Для поддерживающего лечения рекомендована доза по 1 капс./сут в течение 3-4 недель.

Опыт применения препарата у детей ограничен, поэтому не рекомендуется назначать его детям.

### Побочное действие:

Редко наблюдаются побочные эффекты:

*Со стороны ЖКТ:* тошнота, рвота, боль в желудке, метеоризм, диарея и эрозивно-язвенные поражения ЖКТ.

*Со стороны кожных покровов:* эритема и зуд.

*Общие нарушения:* головная боль.

### Передозировка:

---

Нет данных о передозировке препарата при его применении внутрь.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

В первые 3 месяца беременности не рекомендуется использование лекарственного препарата троксерутин.

В течение II и III триместра беременности и при грудном вскармливании назначение препарата требует учитывать соотношение предполагаемой пользы для матери и потенциального риска для ребенка.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Нет данных о неблагоприятном взаимодействии троксерутина с другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Троксерутин неэффективен при отеках, вызванных сопутствующими заболеваниями печени, почек и сердца.

Краситель Е 110 может вызвать аллергические реакции.

*Влияние на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами*

Применение препарата не оказывает влияния на способность водить транспортные средства и работать с машинами.

### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью следует применять препарат при почечной недостаточности длительно.

### **Применение в детском возрасте**

Опыт применения препарата у детей ограничен, поэтому не рекомендуется назначать его детям.

## **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Trokserutin\\_Vramed](http://drugs.thead.ru/Trokserutin_Vramed)