

## [Троксерутин Врамед \(гель\)](#)



### Код АТХ:

- [C05CA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Троксерутин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Гель для наружного применения 2%	1 г
Троксерутин	20 мг

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Флановид (производное рутина), обладает Р-витаминной активностью; оказывает венотонизирующее, ангиопротекторное, противовоспалительное и противоотечное действие.

Его фармакодинамические свойства связаны с участием биофлавоноидов троксерутина в окислительно-восстановительных процессах и ингибировании гиалуронидазы. Ингибируя гиалуронидазу, троксерутин стабилизирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек и уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Обладает антиоксидантной активностью, в результате чего предотвращает окисление аскорбиновой кислоты, адреналина и липидов. Предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток при воздействии на нее различных факторов. Троксерутин снижает экссудативное воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности. В результате лечения троксерутином исчезает чувство тяжести в ногах, уменьшается отечность тканей, улучшается трофика.

#### Фармакокинетика

Троксерутин хорошо всасывается с поверхности кожи при его нанесении в виде геля. Активное вещество проникает в кровеносные сосуды подкожной ткани. При местном применении не вызывает системного действия на органы, так

## Троксерутин Врамед (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

как не наблюдается значительного проникновения троксерутина в общее кровообращение.

### Показания к применению:

- хроническая венозная недостаточность;
- варикозное расширение вен;
- поверхностный тромбофлебит, перифлебит и флеботромбоз;
- посттравматический отек мягких тканей, гематома;
- посттромботический синдром.

### Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Гематомы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Флебит](#)

### Противопоказания:

- детский возраст до 18 лет;
- гиперчувствительность к троксерутину или любому другому вспомогательному веществу геля.

### Способ применения и дозы:

Наружно, место.

#### Взрослым

Гель наносят 2 раза/сут утром и вечером, осторожно втирая его в пораженные участки кожи легкими массирующими движениями. При необходимости гель можно применять в виде компрессов и окклюзивных повязок.

Троксерутин Врамед гель не применяется у детей.

### Побочное действие:

При лечении троксерутином (гель) редко наблюдаются побочные эффекты. При длительном применении возможны покраснение кожи и зуд.

### Передозировка:

Нет данных о передозировке препарата при его местном применении.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных о неблагоприятном влиянии на развитие при применении препарата в первые месяцы беременности, поэтому нет противопоказаний его назначения беременным женщинам.

Нет данных об экскреции препарата в грудное молоко, поэтому троксерутин в виде геля можно назначать женщинам в период грудного вскармливания.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

## **Троксерутин Врамед (гель)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Нет данных о неблагоприятном взаимодействии троксерутина с другими лекарственными средствами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Реакция геля (рН) соответствует таковой кожи, поэтому при наружном применении не вызывает ее раздражения и гиперчувствительности.

Гель не нарушает нормальные физиологические свойства кожи (прохождение через поры, кислотно-щелочное равновесие, проницаемость), так как он создан на водной основе.

*Влияние на способность выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.)*

Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Применение в детском возрасте**

Троксерутин Врамед гель не применяется у детей.

### **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 5 лет; после вскрытия тубы - до 1 месяца.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Trokserutin\\_Vramed\\_gel](http://drugs.thead.ru/Trokserutin_Vramed_gel)